® 07018009 Срібна Рута

Заовник.

Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

росту, середню ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньоранні час початку цвітіння та достигання з наявним Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, сірим опушенням, середньої висоти, мають детермінантний тип опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

□Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою ступінню пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, широкояйцевидний та має заокруглену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – біле.

□Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму. Забарвлення бобу – сіре.

□Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також жовтого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,6 ц/га, Лісостепу – 19,2 ц/га, Полісся – 19,2 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,0; 20,4; 20,6%. Вміст білку відповідно – 38,8; 38,9; 36,5%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-13 см. Маса 1000 насінин – 130,1-155,8 г. Середньостійкий до вилягання. Стійкий до посухи та осипання.

® 07018010 Смуглянка

Заявник:

Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, високі, мають індетермінантний тип росту, середню ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранні час початку цвітіння та достигання та з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□Листок – помірно-зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – біле.

□Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму. Забарвлення бобу – темно-коричневе.

□Насінина – овальної форми з основним жовто-зеленим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,4 ц/га, Лісостепу – 22,4 ц/га, Полісся – 21,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,4; 20,6; 20,8%. Вміст білку відповідно – 39,0; 38,8; 36,7%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 13-22 см. Маса 1000 насінин – 121,9-167,8 г. Середньостійкий до посухи. Стійкий до осипання та вилягання.

07018012 Cysip'n

Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Степ, Лісостеп, Полісся

детермінантний тип росту, відсутнє або дуже слабке завивання стебла, стиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та достигання Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотиля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Середній листочок за розміром – малий, клиновидний та Плисток – помірно-зеленого кольору з помірною ступінню пухирчастості. має загострену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – фіолетове.

Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму верхівки. Забарвлення бобу – коричневе.

□Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 17,7 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 20,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,4; 19,9; 20,6%. Вміст білку відповідно – 41,0; 39,7; 37,5%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-14 см. Маса 1000 насінин – 134,5-165,6 г.

Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

® 06018011 Сяйво

Селекційно-генетичний інститут -Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Cren

Час початку цвітіння середній, а Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту з проміжним типом росту та слабким ступенем завивання, мають середню висоту (71-90 см), жовто-коричневе опушення та проміжну форму куща. час достигання - середньопізній з наявним опадання листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм) з середньою кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середнй за розміром, овальної форми із заокругленою формою верхівки

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має пряму форму та коротку довжину (менше 40 мм), вузький (менше 9 мм). Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки та має темно-коричневого кольору рубчик овальної форми наявним вічком на ньому та без малюнка (смужок) біля нього.

Насіння за масою 1000 зерен -середнє (131-190 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 24,1 ц/га з вмістом жиру 20,4%, білку – 39,4%. Висота прикріплення нижнього бобу – 17,2 см. Маса 1000 насінин – 153,2 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018018 Фортуна

Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотиля, сірим опушенням, з параметрами висоти від середньої до високої, мають проміжний тип росту, відсутнє або дуже слабке завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середній час і початку цвітіння, і достигання – достигання з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Середній листочок за розміром – середній, овальний та має □Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою пухирчастостю.