

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотилия, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають детермінантний тип росту, відсутнє або дуже слабе завивання стебла, стиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та досягання з наявним опаданням листя.

- ☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- ☐ Листок – помірно-зеленого кольору з помірною ступінню пухирчастості. Середній листочок за розміром – малий, клиновидний та має загострену форму верхівки.
- ☐ Забарвлення квітки – фіолетове.
- ☐ Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозигнуту форму верхівки. Забарвлення бобу – коричневе.
- ☐ Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.
- ☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 17,7 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 20,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,4; 19,9; 20,6%. Вміст білку відповідно – 41,0; 39,7; 37,5%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-14 см. Маса 1000 насінин – 134,5-165,6 г. Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

® 06018011 Сяйво

Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортоживчення Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту з проміжним типом росту та слабким ступенем завивання, мають середню висоту (71-90 см), жовто-коричнєве опушення та проміжну форму куща. Час початку цвітіння середній, а час досягання - середньопізній з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм) з середньою кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із заокругленою формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має пряму форму та коротку довжину (менше 40 мм), вузький (менше 9 мм).

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки та має темно-коричневого кольору рубчик овальної форми з наявним вічком на ньому та без малюнка (смужок) біля нього.

Насіння за масою 1000 зерен – середнє (131-190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 24,1 ц/га з вмістом жиру 20,4%, білку – 39,4%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 17,2 см. Маса 1000 насінин – 153,2 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018018 Фортуна

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сад

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилия, сірим опушенням, з параметрами висоти від середньої до високої, мають проміжний тип росту, відсутнє або дуже слабе завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середній час і початку цвітіння, і досягання – достигання з наявним опаданням листя.

☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

☐ Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має