

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотилія, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають детермінантний тип росту, відсутнє або дуже слабе завивання стебла, стиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та досягання з наявним опаданням листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Листок – помірно-зеленого кольору з помірною ступінню пухирчастості. Середній листочок за розміром – малий, клиновидний та має загострену форму верхівки.

Забарвлення квітки – фіолетове.

Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозигнуту форму верхівки. Забарвлення бобу – коричневе.

Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 17,7 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 20,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,4; 19,9; 20,6%. Вміст білку відповідно – 41,0; 39,7; 37,5%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-14 см. Маса 1000 насінин – 134,5-165,6 г.

Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

® 06018011 Сяйво

Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту з проміжним типом росту та слабким ступенем завивання, мають середню висоту (71-90 см), жовто-коричнєве опушення та проміжну форму куща. Час початку цвітіння середній, а час досягання - середньопізній з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм) з середньою кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із заокругленою формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має пряму форму та коротку довжину (менше 40 мм), вузький (менше 9 мм).

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки та має темно-коричневого кольору рубчик овальної форми з наявним вічком на ньому та без малюнка (смужок) біля нього.

Насіння за масою 1000 зерен – середнє (131-190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 24,1 ц/га з вмістом жиру 20,4%, білку – 39,4%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 17,2 см. Маса 1000 насінин – 153,2 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018018 Фортуна

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилія, сірим опушенням, з параметрами висоти від середньої до високої, мають проміжний тип росту, відсутнє або дуже слабе завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середній час і початку цвітіння, і досягання – досягання з наявним опаданням листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має

заокруглену форму верхівки.

Забарвлення квітки – фіолетове.

Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світле.

Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

Насіння за масою 1000 зерен – середнє.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,5 ц/га, Лісостепу – 21,7 ц/га, Полісся – 22,6 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,3; 19,5; 19,8%. Вміст білку відповідно – 40,8; 39,8; 37,7%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 12-18 см. Маса 1000 насінин – 126,9-168,3 г.

Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

07018006 Хуторяночка

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут юрмів Української академії аграрних наук

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилля, сірим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабку ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранні час початку цвітіння та досягання та з наявним опаданням листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Листок – помірно-зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.

Забарвлення квітки – фіолетове.

Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу – світле.

Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,9 ц/га, Лісостепу – 22,5 ц/га, Полісся – 19,6 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,2; 19,5; 20,6%. Вміст білку відповідно – 40,0; 39,1; 36,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 11-16 см. Маса 1000 насінин – 134,5-151,7 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

07018014 Черемош

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, напіввстиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та досягання з наявним опаданням листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.

Забарвлення квітки – фіолетове.

Біб короткий та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричневе.