

заокруглену форму верхівки.

- ☐ Забарвлення квітки – фіолетове.
- ☐ Біб середньої довжини та вузький, слабкозигнутої форми. Забарвлення бобу – світле.
- ☐ Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.
- ☐ Насіння за масою 1000 зерен – середнє.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,5 ц/га, Лісостепу – 21,7 ц/га, Полісся – 22,6 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,3; 19,5; 19,8%. Вміст білку відповідно – 40,8; 39,8; 37,7%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 12-18 см. Маса 1000 насінин – 126,9-168,3 г. Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

07018006 Хуторяночка

Заявник: Інститут юрмів Української академії аграрних наук

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилія, сірим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабку ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранні час початку цвітіння та достигання та з наявним опаданням листя.

- ☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- ☐ Листок – помірно-зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.
- ☐ Забарвлення квітки – фіолетове.
- ☐ Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу – світле.
- ☐ Насінина – округло-виупклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.
- ☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,9 ц/га, Лісостепу – 22,5 ц/га, Полісся – 19,6 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,2; 19,5; 20,6%. Вміст білку відповідно – 40,0; 39,1; 36,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 11-16 см. Маса 1000 насінин – 134,5-151,7 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

07018014 Черемош

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилія, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та достигання з наявним опаданням листя.

- ☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- ☐ Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.
- ☐ Забарвлення квітки – фіолетове.
- ☐ Біб короткий та вузький, слабкозигнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричнєве.

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся