

заокруглену форму верхівки.

- ☐ Забарвлення квітки – фіолетове.
- ☐ Біб середньої довжини та вузький, слабкозигнутої форми. Забарвлення бобу – світле.
- ☐ Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.
- ☐ Насіння за масою 1000 зерен – середнє.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,5 ц/га, Лісостепу – 21,7 ц/га, Полісся – 22,6 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,3; 19,5; 19,8%. Вміст білку відповідно – 40,8; 39,8; 37,7%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 12-18 см. Маса 1000 насінин – 126,9-168,3 г. Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

07018006 Хуторяночка

Заявник: Інститут юрмів Української академії аграрних наук

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилія, сірим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабку ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранні час початку цвітіння та достигання та з наявним опаданням листя.

- ☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- ☐ Листок – помірно-зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.
- ☐ Забарвлення квітки – фіолетове.
- ☐ Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу – світле.
- ☐ Насінина – округло-виупклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини світло-коричневого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.
- ☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,9 ц/га, Лісостепу – 22,5 ц/га, Полісся – 19,6 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,2; 19,5; 20,6%. Вміст білку відповідно – 40,0; 39,1; 36,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 11-16 см. Маса 1000 насінин – 134,5-151,7 г. Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

07018014 Черемош

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилія, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та достигання з наявним опаданням листя.

- ☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- ☐ Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має загострену форму верхівки.
- ☐ Забарвлення квітки – фіолетове.
- ☐ Біб короткий та вузький, слабкозигнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричнєве.

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

- Насіннина – овално-видовженої форми з основним світло-коричневим забарвленням оболонки. Рубчик насіннини також світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.
- Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 22,6 ц/га, Лісостепу – 22,5 ц/га, Полісся – 21,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,7; 20,5; 20,6%. Вміст білку відповідно – 39,8; 38,9; 38,4%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-12 см. Маса 1000 насінин – 164,1-187,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

07016030 Ексел

Заявник: Монсантао Інтернешнл Сьорл

Ріпак озимий

Степ, Лісостеп, Полісся

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною – вузька, за довжиною – коротка. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка – короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби – сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 36,5 ц/га, Лісостепу – 38,5 ц/га, Полісся – 34,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 45,6-45,8%, білку – в межах 20,1-22,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,8%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 8,4-9,0; осипання – 6,9-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 7,9-8,8 бала.

06016025 Астрада

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Лісостеп

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною – середня, за довжиною – середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з великою кількістю часток. Довжина черешка листка – довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби – відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 36,9 ц/га. Вміст жиру – 44,4%, білку – 22,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,5%.

Стійкість до вилягання – 8,5; посухи – 8,5; осипання – 7,5 бала.

Зимостійкість – 8,2 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

07016017 Абакус

Заявник: Норддойче Пфланцензукт Ханс-Георг Лембке КГ

Степ, Лісостеп, Полісся

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною – середня, за довжиною – середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з великою кількістю часток. Довжина черешка листка – середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби – сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 37,9 ц/га, Лісостепу – 36,6 ц/га, Полісся – 30,82 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-44,8%, білку – в межах 23,0-24,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 7,7-8,6; осипання – 6,7-7,0 бала.