

- Насіннина – овално-видовженої форми з основним світло-коричневим забарвленням оболонки. Рубчик насіннини також світло-коричневого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.
- Маса 1000 зерен – середня.

Напряма використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 22,6 ц/га, Лісостепу – 22,5 ц/га, Полісся – 21,5 ц/га. Вміст жиру відповідно – 19,7; 20,5; 20,6%. Вміст білку відповідно – 39,8; 38,9; 38,4%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-12 см. Маса 1000 насінин – 164,1-187,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

07016030 Ексел

Заявник: Монсантао Інтернешнл Сьорл

Ріпак озимий

Степ, Лісостеп, Полісся

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною – вузька, за довжиною – коротка. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка – короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби – сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 36,5 ц/га, Лісостепу – 38,5 ц/га, Полісся – 34,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 45,6-45,8%, білку – в межах 20,1-22,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,8%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 8,4-9,0; осипання – 6,9-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 7,9-8,8 бала.

06016025 Астрада

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Лісостеп

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною – середня, за довжиною – середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з великою кількістю часток. Довжина черешка листка – довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби – відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 36,9 ц/га. Вміст жиру – 44,4%, білку – 22,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,5%.

Стійкість до вилягання – 8,5; посухи – 8,5; осипання – 7,5 бала.

Зимостійкість – 8,2 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 9,0 балів.

07016017 Абакус

Заявник: Норддойче Пфланцензукт Ханс-Георг Лембке КГ

Степ, Лісостеп, Полісся

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною – середня, за довжиною – середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з великою кількістю часток. Довжина черешка листка – середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби – сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 37,9 ц/га, Лісостепу – 36,6 ц/га, Полісся – 30,82 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-44,8%, білку – в межах 23,0-24,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 7,7-8,6; осипання – 6,7-7,0 бала.