

Зимостійкість – в межах 7,3-8,7 бала.

07016020 Аплаус

Заявник: Селген, а.с.

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 28,3 ц/га, Лісостепу – 31,6 ц/га, Полісся – 26,6 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-44,6%, білку – в межах 22,4-23,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 8,7-8,9; осипання – 6,5-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 8,2-8,7 бала.

® 07016035 Брентано

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 28,3 ц/га, Лісостепу – 37,5 ц/га, Полісся – 28,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-44,1%, білку – в межах 22,8-23,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,4-8,7; осипання – 7,0-7,1 бала.

Зимостійкість – в межах 8,1-8,6 бала.

® 07016039 Багіра

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 41,0 ц/га, Полісся – 28,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,1%, білку – 22,5-22,7%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,6; посухи – 8,4-8,6; осипання – 7,0-7,8 бала.

Зимостійкість – в межах 7,9-8,6 бала.

® 07016041 Белана

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з великою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 39,0 ц/га, Полісся – 28,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,1%, білку – 23,0-23,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,6; осипання – 6,9-8,2 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп, Полісся

Лісостеп, Полісся