

Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,6-8,8; осипання – 6,5-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 7,9-8,8 бала.

07016034 ДК Екстрейн

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довгий. Зубчастість краю листка сильна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 33,1 ц/га, Полісся – 27,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,3%, білку – в межах 22,6-24,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи – 8,5-8,8; осипання – 7,0-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 7,5-8,8 бала.

06016019 ДК Серенада

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 32,9 ц/га, Лісостепу – 38,3 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,6-44,7%, білку – в межах 22,2-24,0%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,7-0,8%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,8; посухи – 8,3-8,4; осипання – 7,1-7,7 бала.
Зимостійкість – в межах 7,0-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,8-9,0 балів.

06016020 ДК Секюр

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середня кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 31,3 ц/га, Лісостепу – 39,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,4-43,8%, білку – в межах 23,1-24,2%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,8%.

Стійкість до вилягання – 8,7-8,8; посухи – 8,1-8,3; осипання – 6,5-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 6,8-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,7-9,0 балів.

06016018 Екзотік

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середня кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною