

Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,6-8,8; осипання – 6,5-7,5 бала.  
Зимостійкість – в межах 7,9-8,8 бала.

### **07016034 ДК Екстрейн**

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довгий. Зубчастість краю листка сильна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 33,1 ц/га, Полісся – 27,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,3%, білку – в межах 22,6-24,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи – 8,5-8,8; осипання – 7,0-7,4 бала.  
Зимостійкість – в межах 7,5-8,8 бала.

### **06016019 ДК Серенада**

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 32,9 ц/га, Лісостепу – 38,3 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,6-44,7%, білку – в межах 22,2-24,0%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,7-0,8%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,8; посухи – 8,3-8,4; осипання – 7,1-7,7 бала.  
Зимостійкість – в межах 7,0-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,8-9,0 балів.

### **06016020 ДК Секюр**

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середня кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 31,3 ц/га, Лісостепу – 39,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,4-43,8%, білку – в межах 23,1-24,2%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,8%.

Стійкість до вилягання – 8,7-8,8; посухи – 8,1-8,3; осипання – 6,5-7,4 бала.  
Зимостійкість – в межах 6,8-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,7-9,0 балів.

### **06016018 Екзотік**

Заявник: Монсанто Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середня кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною

короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 31,4 ц/га, Лісостепу – 35,6 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,4-44,0%, білку – в межах 22,6-24,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,7-0,9%.

Стійкість до вилягання – 7,9-8,6; посухи – 8,3-8,5; осипання – 6,6-7,5 бала.

Зимостійкість – в межах 6,3-8,5 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,8-9,0 балів.

### 06016021 Екстенд

Заявник: Монсанта Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квіткі жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 36,5 ц/га, Полісся – 34,1 ц/га. Вміст жиру – 43,8%, білку – 23,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,2%, глюкозинолатів – 0,8%.

Стійкість до вилягання – 8,7-8,8; посухи – 8,4-8,5; осипання – 6,9-7,5 бала.

Зимостійкість – в межах 8,4-8,6 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,4-8,7 бала.

### 06016022 Емблем

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, середня кількість часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квіткі жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 36,1 ц/га, Лісостепу – 35,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,3-43,6%, білку – в межах 23,2-24,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,7-0,8%.

Стійкість до вилягання – 8,5-8,8; посухи – 8,4; осипання – 7,1-7,5 бала.

Зимостійкість – в межах 6,6-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,6-8,8 бала.

### 06016023 ЕС Артїст

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, середня кількість часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квіткі жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 33,1 ц/га, Лісостепу – 37,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,2-44,0%, білку – в межах 22,0-24,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,2%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,1-8,5; посухи – 8,1-8,4; осипання – 7,1-7,5 бала.

Зимостійкість – в межах 6,4-8,4 бала.

## Лісостеп, Полісся

## Степ, Лісостеп

## Степ, Лісостеп