

короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу - 31,4 ц/га, Лісостепу - 35,6 ц/га. Вміст жиру - в межах 43,4-44,0%, білку - в межах 22,6-24,5%. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - в межах 0,7-0,9%.

Стійкість до вилягання - 7,9-8,6; посухи - 8,3-8,5; осипання - 6,6-7,5 бала.

Зимостійкість - в межах 6,3-8,5 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом - 8,8-9,0; бактеріозом - 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,8-9,0 балів.

06016021 Екстенд

Заявник: Монсантао Інтернешнл Сьорл

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квіткі жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу - 36,5 ц/га, Полісся - 34,1 ц/га. Вміст жиру - 43,8%, білку - 23,2%. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюкозинолатів - 0,8%.

Стійкість до вилягання - 8,7-8,8; посухи - 8,4-8,5; осипання - 6,9-7,5 бала.

Зимостійкість - в межах 8,4-8,6 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0; бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,4-8,7 бала.

06016022 Емблем

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, середня кількість часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квіткі жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу - 36,1 ц/га, Лісостепу - 35,7 ц/га. Вміст жиру - в межах 43,3-43,6%, білку - в межах 23,2-24,4%. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюкозинолатів - в межах 0,7-0,8%.

Стійкість до вилягання - 8,5-8,8; посухи - 8,4; осипання - 7,1-7,5 бала.

Зимостійкість - в межах 6,6-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом - 8,8-9,0; бактеріозом - 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 8,6-8,8 бала.

06016023 ЕС Артїст

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої ширини і довжини. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, середня кількість часток. Довжина черешка листка середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квіткі жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу - 33,1 ц/га, Лісостепу - 37,1 ц/га. Вміст жиру - в межах 43,2-44,0%, білку - в межах 22,0-24,5%. Вміст ерукової кислоти - 0,2%, глюкозинолатів - 0,7%.

Стійкість до вилягання - 8,1-8,5; посухи - 8,1-8,4; осипання - 7,1-7,5 бала.

Зимостійкість - в межах 6,4-8,4 бала.

Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп

Степ, Лісостеп