

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,4-8,6 бала.

07016008 ЕС Аліас

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довгий. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Полісся – 29,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,5%, білку – в межах 23,0-24,1%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 8,6; осипання – 6,9 бала.

Зимостійкість – 8,8 бала.

07016009 ЕС Нептун

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок великий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - довгий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Пізній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 32,4 ц/га, Полісся – 29,0 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,4-44,8%, білку – 24,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,8%.

Стійкість до вилягання – 9,0; посухи – 8,3-8,6; осипання – 6,9-7,0 балів.

Зимостійкість – в межах 8,1-8,8 бала.

06016038 Клеопатра

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довгий. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 28,9 ц/га, Лісостепу – 32,3 ц/га, Полісся – 31,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,5-44,7%, білку – в межах 22,6-24,0%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,6-8,9; посухи – 8,3-8,7; осипання – 6,7-7,0 балів.

Зимостійкість – в межах 7,5-8,7 бала

06016043 Ладого

Заявник: Лімагрейн Юроп

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 29,3 ц/га, Лісостепу – 33,6 ц/га, Полісся – 29,4 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,7-45,4%, білку – в межах 20,5-22,8%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.