

Стійкість до вилягання – 8,8-9,0; посухи – 8,1-8,7; осипання – 7,0-7,4 бала.
Зимостійкість – в межах 7,8-8,7 бала.

® 07016043 Мерано

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,6 ц/га, Лісостепу – 39,3 ц/га, Полісся – 29,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,8-44,6%, білку – в межах 21,1-23,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,9; посухи – 8,0-8,6; осипання – 7,0-8,2 бала.

Зимостійкість – в межах 7,5-8,6 бала.

06016044 Манітоба

Заявник: Лімагрейн Юроп

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка слабка. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 34,3 ц/га, Полісся – 31,3 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-44,5%, білку – в межах 21,3-23,3%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,9-9,0; посухи – 8,4-8,6; осипання – 7,0-7,5 бала.

Зимостійкість – в межах 8,4-8,8 бала.

® 06016032 ОПБН13

Заявник: Осева ПРО с.р.о.а

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середньої, за шириною широкі. Зубчастість краю листка помірна, листок середньої довжини і ширини, мала кількість часток. Довжина черешка листка середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 35,4 ц/га. Вміст жиру – 44,7%, білку – 22,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,2%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,3; посухи – 8,5; осипання – 7,2 бала.

Зимостійкість – 8,6 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квітководом – 9,0 балів.

07016022 ОП 02

Заявник: Осева ПРО с.р.о.а

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з малою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп, Полісся

Лісостеп

Степ, Лісостеп, Полісся