

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 27,8 ц/га, Лісостепу – 36,1 ц/га, Полісся – 24,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,7-44,8%, білку – в межах 21,8-22,7%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи 8,6-8,7; осипання – 6,6-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 7,0-8,7 бала.

® 07016014 Релли

Заявник: Дойче Заатферделунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - вид середньої до довгої. Зубчастість краю листка від помірної до сильної. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою середня. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна..

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 38,2 ц/га, Лісостепу – 39,2 ц/га, Полісся – 31,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,5%, білку – в межах 22,4-23,4%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,3-8,8; осипання – 7,2-8,1 бала.
Зимостійкість – в межах 7,6-8,0 балів.

07016019 Рохан

Заявник: Норддойче Пфланцензукт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з великою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Дуже ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 35,3 ц/га, Лісостепу – 36,1 ц/га, Полісся – 32,4 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-45,4%, білку – в межах 21,9-24,1%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,5-0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,0-9,0; посухи – 7,8-8,6; осипання – 7,0-7,9 бала.
Зимостійкість – в межах 7,8-8,7 бала.

06016037 Снігова королева

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з малою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослини середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 37,2 ц/га, Полісся – 29,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,6-45,0%, білку – в межах 22,9-23,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,6-8,9; посухи – 8,3-8,6; осипання – 7,0 балів.
Зимостійкість – в межах 8,1-8,7 бала.

® 07016013 Сітро

Заявник: Дойче Заатферделунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість помірна. Листок середній з середньою до великої кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою від середньої до довгої. Колір

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся