

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 27,8 ц/га, Лісостепу – 36,1 ц/га, Полісся – 24,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,7-44,8%, білку – в межах 21,8-22,7%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи 8,6-8,7; осипання – 6,6-7,5 бала.
Зимостійкість – в межах 7,0-8,7 бала.

® 07016014 Релли

Заявник: Дойче Заатферделунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - вид середньої до довгої. Зубчастість краю листка від помірної до сильної. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою середня. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 38,2 ц/га, Лісостепу – 39,2 ц/га, Полісся – 31,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,5%, білку – в межах 22,4-23,4%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,0-8,9; посухи – 8,3-8,8; осипання – 7,2-8,1 бала.
Зимостійкість – в межах 7,6-8,0 балів.

07016019 Рохан

Заявник: Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з великою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Дуже ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - сильна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 35,3 ц/га, Лісостепу – 32,4 ц/га, Полісся – 36,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-45,4%, білку – в межах 21,9-24,1%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,5-0,6%.
Стійкість до вилягання – 8,0-9,0; посухи – 7,8-8,6; осипання – 7,0-7,9 бала.
Зимостійкість – в межах 7,8-8,7 бала.

06016037 Снігова королева

Заявник: Національний університет біоресурсів і природокористування

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з малою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослини середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 37,2 ц/га, Полісся – 29,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,6-45,0%, білку – в межах 22,9-23,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
Стійкість до вилягання – 8,6-8,9; посухи – 8,3-8,6; осипання – 7,0 балів.
Зимостійкість – в межах 8,1-8,7 бала.

® 07016013 Сітро

Заявник: Дойче Заатферделунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість помірна. Листок середній з середньою до великої кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою від середньої до довгої. Колір

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Від раннього до середнього часу цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 39,8 ц/га, Лісостепу – 38,0 ц/га, Полісся – 32,4 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,8%, білку – в межах 22,0-23,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.
 Стійкість до вилягання – 7,5-8,9; посухи – 8,4-8,8; осипання – 7,2-8,1 бала.
 Зимостійкість – в межах 7,5-8,7 бала.

06016040 Тассіло

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 33,2 ц/га, Полісся – 29,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,8-45,0%, білку – в межах 20,9-23,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,5-8,7; посухи – 8,4; осипання – 7,0-7,3 бала.
 Зимостійкість – в межах 8,0-8,7 бала.

07016048 Труді

Заявник: Дікманн ГмбХ і Ко. КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю слабка. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою середня. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Середній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,7 ц/га, Лісостепу – 31,1 ц/га, Полісся – 30,0 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,9-44,2%, білку – в межах 21,0-23,2%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
 Стійкість до вилягання – 8,3-8,8; посухи – 8,5-8,7; осипання – 6,8-7,4 бала.
 Зимостійкість – в межах 7,9-8,6 бала.

® 07016046 Флеш

Заявник: Дойче Заатферделунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка від помірної до сильної. Листок кількістю часток від середньої до великої. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Від раннього до середнього часу цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби від дуже слабкої до слабкої.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 37,4 ц/га, Лісостепу – 39,9 ц/га, Полісся – 32,2 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-44,8%, білку – в межах 22,4-23,4%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.
 Стійкість до вилягання – 8,0-8,7; посухи – 8,1-8,8; осипання – 7,2-8,0 бала.
 Зимостійкість – в межах 7,5-8,7 бала.

06016029 Фінесс

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся