

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина за повного цвітіння висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна.. Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу - 15,0 ц/га, Лісостепу - 20,4 ц/га, Полісся - 20,3 ц/га. Вміст жиру - у межах 44,5-45,2%. Вміст білку - у межах 22,5-25,0%. Вміст ерукової кислоти - 0,0-0,1%. Вміст глюकोзинолатів - 0,6-0,7%. Стійкий до вилягання. Середньостійкий до осипання та посухи.

® 06016042 Сальса КЛ

Заявник: Норддойче Пфланцензукт Ханс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна, листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з коротким зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу - 14,3 ц/га, Лісостепу - 20,9 ц/га, Полісся - 21,7 ц/га. Вміст жиру - в межах 44,6-45,9%, білку - в межах 23,8-25,4%. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання - в межах 8,3-9,0; посухи - в межах 6,6-8,3; осипання - в межах 7,2-8,3 бала. Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0 балів; бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - в межах 8,3-9,0 балів.

Гірчиця сарептська

® 09144001 Ельвіра

Заявник:

ТОВ "Науково-дослідне виробниче підприємство "Українська гірчиця"

Ерукова кислота в насінні відсутня, ефірність насіння висока (понад 0,6 %), забарвлення насіння жовте, маса 1000 насінин велика, сім'ядолі зелені за кольором. Нижній листок за розміром пластинки великий, за формою - еліптичний, за формою краю та розсіченістю листкової пластинки зубчастий. Верхній листок за краєм листкової пластинки зубчастий. Опущеність листка відсутня, справжній листок темно-зеленого кольору, восковий наліт на листку відсутній. Рослина за висотою висока, за кольором стебла - зелена, восковий наліт на стеблі відсутній. Форма суцвіття китиця, забарвлення пелюсток квітки золотисто-жовті, стручок короткий за довжиною, за довжиною зубця - короткий, за тривалістю вегетаційного періоду сорт пізньостиглий.

За даними заявника урожайність 30,0 ц/га, вміст ефірної олії 46 %, вміст ерукової кислоти 2,0 %, ураження переноспорозом 2 %.

® 09144002 Іріда

Заявник:

ТОВ "Науково-дослідне виробниче підприємство "Українська гірчиця"

Ерукова кислота в насінні відсутня, ефірність насіння висока (понад 0,6 %), забарвлення темно-коричневе, маса 1000 насінин велика, сім'ядолі зелені за кольором. Нижній листок за розміром пластинки великий, за формою - ліровидний, за формою краю та розсіченістю листкової пластинки зубчастий. Верхній листок за краєм листкової пластинки зубчастий. Опущеність листка відсутня, справжній листок зеленого кольору, восковий наліт на листку відсутній. Рослина середня за

Степ, Лісостеп, Полісся

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп, Степ