

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 14155002 Назва сорту: ЛЕСТРІС Заявник (код): 924 Власник сорту (код): 924

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171315

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінніна: забарвлення шкірки	різномальорове	3
2	Плоїдність	диплойд	2
3	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
4	Сім'ядолі: за ширину	вузькі	3
5	Рослина: за висотою у рік сівби	низька	3
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	помірна	5
7	Рослина: габітур весни у рік сівби	напівпрямий	3
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	сильна	7
9	Рослина: за висотою навесні	низька	3
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Стебло: за довжиною	коротке	3
13	Стебло: за товщиною	середнє	5
14	Стебло: кількість міжвузлів	середня	5
15	Стебло: щільність опушенні	помірна	5
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1
17	Листок: центральний листочек за довжиною	середній	5
18	Листок: центральний листочек за ширину	середній	5
19	Листок: частота наявності білих міток	дуже висока	9
20	Рослина: за природною висотою другого укусу	низька	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	61,1	68,8	
Довірчий інтервал, ц/га (+)	9,0	4,7	
Урожайність, сухої речовини, ц/га	72,5	77,8	
+/- до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	11,3	9	
+/- до усередненого значення за 5 попередніх років, %	18	13	
Тривалість періоду вегетації, діб	83	71	
Стійкість до вилягання, бал	8,4	8,1	
Стійкість до посухи, бал	8,4	7,6	
Стійкість проти стеблової іржі, бал	8,7	8,4	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8,7	8,5	
Стійкість проти антракнозу, бал	8,7	8,5	
Зимостійкість, бал	8,7	8,7	
Залистяльність, %	45,4	47,2	
Вміст сирого протеїну, %	20,0	19,0	
Напрям використання	корм	корм	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.