

пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Від раннього до середнього часу цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 39,8 ц/га, Лісостепу – 38,0 ц/га, Полісся – 32,4 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,8%, білку – в межах 22,0-23,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 7,5-8,9; посухи – 8,4-8,8; осипання – 7,2-8,1 бала.

Зимостійкість – в межах 7,5-8,7 бала.

06016040 Тассіло

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 33,2 ц/га, Полісся – 29,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,8-45,0%, білку – в межах 20,9-23,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,5-8,7; посухи – 8,4; осипання – 7,0-7,3 бала.

Зимостійкість – в межах 8,0-8,7 бала.

07016048 Труді

Заявник: Дікманн ГмбХ і Ко. КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю слабка. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою середня. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Середній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,7 ц/га, Лісостепу – 31,1 ц/га, Полісся – 30,0 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,9-44,2%, білку – в межах 21,0-23,2%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,8; посухи – 8,5-8,7; осипання – 6,8-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 7,9-8,6 бала.

® 07016046 Флеш

Заявник: Дойче Заатфеределунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка від помірної до сильної. Листок кількістю часток від середньої до великої. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Від раннього до середнього часу цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби від дуже слабкої до слабкої.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 37,4 ц/га, Лісостепу – 39,9 ц/га, Полісся – 32,2 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-44,8%, білку – в межах 22,4-23,4%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,0-8,7; посухи – 8,1-8,8; осипання – 7,2-8,0 бала.

06016029 Фінекс

Заявник: Рапс ГбР Заатцухт Лундсгаард

Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся