

пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Від раннього до середнього часу цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби помірна..

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 39,8 ц/га, Лісостепу – 38,0 ц/га, Полісся – 32,4 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,0-44,8%, білку – в межах 22,0-23,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 7,5-8,9; посухи – 8,4-8,8; осипання – 7,2-8,1 бала.

Зимостійкість – в межах 7,5-8,7 бала.

06016040 Тассіло

Лісостеп, Полісся

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - помірна.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Лісостепу – 33,2 ц/га, Полісся – 29,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,8-45,0%, білку – в межах 20,9-23,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,5-8,7; посухи – 8,4; осипання – 7,0-7,3 бала.

Зимостійкість – в межах 8,0-8,7 бала.

07016048 Труді

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Дікманн ГмбХ і Ко. КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю слабка. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина за висотою середня. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною довгий. Середній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,7 ц/га, Лісостепу – 31,1 ц/га, Полісся – 30,0 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,9-44,2%, білку – в межах 21,0-23,2%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,2%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,3-8,8; посухи – 8,5-8,7; осипання – 6,8-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 7,9-8,6 бала.

® 07016046 Флеш

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Дойче Заатфеределунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка від помірної до сильної. Листок кількістю часток від середньої до великої. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Від раннього до середнього часу цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби від дуже слабкої до слабкої..

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 37,4 ц/га, Лісостепу – 39,9 ц/га, Полісся – 32,2 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-44,8%, білку – в межах 22,4-23,4%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,0-0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,0-8,7; посухи – 8,1-8,8; осипання – 7,2-8,0 бала.

Зимостійкість – в межах 7,5-8,7 бала.

06016029 Фінекс

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини і ширини. Зубчастість краю листка слабка, листок середньої довжини і ширини з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 32,8 ц/га, Лісостепу – 37,5 ц/га, Полісся – 32,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-46,3%, білку – в межах 20,1-21,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи – 8,3-8,8; осипання – 7,1-7,5 бала.

Зимостійкість – в межах 7,5-8,8 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,3-9,0 балів.

Лісостеп

06016033 Франкі

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною короткі, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна, листок короткий за довжиною і вузький за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка коротка. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий з довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 36,4 ц/га. Вміст жиру – 44,0%, білку – 23,1%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,6; посухи – 8,2; осипання – 7,6 бала.

Зимостійкість – 8,1 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,7 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

07016049 Харді

Заявник: Дікманн ГмбХ і Ко. КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,9 ц/га, Лісостепу – 31,5 ц/га, Полісся – 28,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,8-44,6%, білку – в межах 22,5-23,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,1-8,6; посухи – 7,9-8,5; осипання – 6,8-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 7,4-8,4 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

® 05016003 Хорнет

Заявник: Дойче Заатферделунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність за роки випробування (2006, 2007, 2009) у зоні Степу – 39,0 ц/га, Лісостепу – 39,0 ц/га, Полісся – 34,6 ц/га. Вміст жиру – в межах 44-45%, білку – в межах 19,9-23,5%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,3%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,9%.

Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи – 8,4-9,0; осипання – 7,3-8,3 бала.

Зимостійкість – в межах 8,3-9,0 балів.