

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина за повного цвітіння висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Ранній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 15,0 ц/га, Лісостепу – 20,4 ц/га, Полісся – 20,3 ц/га. Вміст жиру – у межах 44,5-45,2%. Вміст білку – у межах 22,5-25,0%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,6-0,7%.

Стійкий до вилягання. Середньостійкий до осипання та посухи.

Степ, Лісостеп, Полісся

® 06016042 Сальса КЛ

Заявник: Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна, листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з коротким зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 14,3 ц/га, Лісостепу – 20,9 ц/га, Полісся – 21,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,6-45,9%, білку – в межах 23,8-25,4%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,3-9,0; посухи – в межах 6,6-8,3; осипання – в межах 7,2-8,3 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,3-9,0 балів.

Гірчиця сарептська

® 09144001 Ельвіра

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп,  
Степ

Заявник: ТОВ "Науково-дослідне виробниче аграрне підприємство "Українська гірчиця"

Ерукова кислота в насінні відсутня, ефірність насіння висока (понад 0,6 %), забарвлення насіння жовте, маса 1000 насінин велика, сім'ядолі зелені за кольором. Нижній листок за розміром пластинки великий, за формою – еліптичний, за формою краю та розсіченістю листкової пластинки зубчастий. Верхній листок за краєм листкової пластинки зубчастий. Опушеність листка відсутня, справжній листок темно-зеленого кольору, восковий наліт на листку відсутній. Рослина за висотою висока, за кольором стебла – зелена, восковий наліт на стеблі відсутній. Форма суцвіття китиця, забарвлення пелюсток квітки золотисто-жовті, стручок короткий за довжиною, за довжиною зубця – короткий, за тривалістю вегетаційного періоду сорт пізньостиглий.

За даними заявника урожайність 30,0 ц/га, вміст ефірної олії 46 %, вміст ерукової кислоти 2,0 %, ураження пероноспорозом 2 %.

® 09144002 Іріда

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп,  
Степ

Заявник: ТОВ "Науково-дослідне виробниче аграрне підприємство "Українська гірчиця"

Ерукова кислота в насінні відсутня, ефірність насіння висока (понад 0,6 %), забарвлення темно-коричневе, маса 1000 насінин велика, сім'ядолі зелені за кольором. Нижній листок за розміром пластинки великий, за формою – ліровидний, за формою краю та розсіченістю листкової пластинки зубчастий. Верхній листок за краєм листкової пластинки зубчастий. Опушеність листка відсутня, справжній листок зеленого кольору, восковий наліт на листку відсутній. Рослина середня за

висотою, за кольором стебла – зелена, восковий наліт на стеблі відсутній. Форма суцвіття китиця, забарвлення пелюсток квітки блідо-жовті, стручок довгий за довжиною, за довжиною зубця – короткий, за тривалістю вегетаційного періоду сорт скоростиглий.

За даними заявника урожайність 2,5 ц/га, вміст ефірної олії 45 %, вміст ерукової кислоти 1,0 %, ураження переноспорозом 2 %.

### Гірчиця біла

® 08092002 Запоріжанка

Зона вирощування: Лісостеп.

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Рослина за висотою (під час цвітіння) із середньої до високої, за загальною довжиною – довга, інтенсивність зеленого забарвлення листка помірна, кількість часток листка (за повного розвитку) - середня, зубчатість краю листка - помірна, довжина черешка листка довга, листок за шириною - широкий, за довжиною - довгий, час цвітіння середній, інтенсивність жовтого забарвлення пелюсток квітки світла, довжина пелюсток квітки довга, ширина від середньої до широкої, стручок за довжиною середній, стручок - довжина гачка - середній, довжина ніжки стручка середня, кількість насінин у стручку середня, маса 1000 насінин велика, сім'ядоля за довжиною від середньої до довгої, за шириною – широка, ерукова кислота в насінні наявна. Диплоїд.

За даними заявника урожайність насіння (за 12% вологості) 2,0 т/га, вміст глюकोзинолатів 25 мколь, вміст олії 30 %, вміст ерукової кислоти 7,0 %. Стійкість до бактеріозу та переноспорозу висока (по 7 балів), стійкість до квіткогризу 9 балів, стійкість до ураження пильщиком і жуком-блішкою по 7 балів. Напрямок використання - на насіння, фураж і сидерати.

09092002 Ослава

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп,  
Степ

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Рослина за висотою (під час цвітіння) висока, інтенсивність зеленого забарвлення листка помірна, кількість часток листка (за повного розвитку) - середня, зубчатість краю листка - помірна, довжина черешка листка довга, листок за шириною - широкий, за довжиною - довгий, час цвітіння ранній, інтенсивність жовтого забарвлення пелюсток квітки помірна, довжина і ширина пелюсток квітки середня, стручок за довжиною короткий, стручок - довжина гачка - довгий, довжина ніжки стручка середня, кількість насінин в стручку середня, маса 1000 насінин середня, сім'ядоля за довжиною середня, за шириною – середня, ерукова кислота в насінні наявна. Диплоїд.

За даними заявника урожайність насіння (за 12% вологості) 2,8 т/га, вміст білка 27,5 %, вміст глюकोзинолатів 55 мколь, вміст олії 26 %, вміст ерукової кислоти 18,5 %. Стійкість до бактеріозу та переноспорозу по 1 балу, пошкодження квіткогризом і пильщиком по 3 бали, стійкість до ураження жуком-блішкою 5 балів. Напрямок використання - на насіння, фураж і сидерати.

### Мак снотворний

05095001 Альмадін

Зона вирощування: Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"

Опушення та білі плями листової розетки відсутні. Стебло: діаметр розетки середній, розгалуження стебла подвоєне, за довжиною середнє, антоціанове забарвлення (між коробочкою та верхівкою стебла) відсутнє, опушеність – середня. Стебловий листок з верхньої сторони має зелений колір з жовтуватим відтінком, восковий наліт слабкий, надрізи країв стеблових листків двічі зубчасті. Пелюстка білого забарвлення з плямами у вигляді смуг фіолетового кольору, інтенсивність фіолетового забарвлення плям слабка, колір тичинки білий, розсічення пелюстки відсутнє. Час цвітіння середній. Коробочка: еліптичної форми (у