

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядоля середньої довжини і ширини. Зубчастість краю листка слабка, листок середньої довжини і ширини з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середньої довжини з середнім зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 32,8 ц/га, Лісостепу – 37,5 ц/га, Полісся – 32,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,5-46,3%, білку – в межах 20,1-21,9%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи – 8,3-8,8; осипання – 7,1-7,5 бала.

Зимостійкість – в межах 7,5-8,8 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,3-9,0 балів.

## Лісостеп

### 06016033 Франкі

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.Б.Х

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною короткі, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна, листок короткий за довжиною і вузький за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка коротка. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий з довгим зубцем. Час цвітіння середній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 36,4 ц/га. Вміст жиру – 44,0%, білку – 23,1%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,6; посухи – 8,2; осипання – 7,6 бала.

Зимостійкість – 8,1 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,7 бала.

## Степ, Лісостеп, Полісся

### 07016049 Харді

Заявник: Дікманн ГмбХ і Ко. КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 30,9 ц/га, Лісостепу – 31,5 ц/га, Полісся – 28,5 ц/га. Вміст жиру – в межах 43,8-44,6%, білку – в межах 22,5-23,2%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,7%.

Стійкість до вилягання – 8,1-8,6; посухи – 7,9-8,5; осипання – 6,8-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 7,4-8,4 бала.

## Степ, Лісостеп, Полісся

### 05016003 Хорнет

Заявник: Дойче Заатферделунг АГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середній. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - слабка.

Урожайність за роки випробування (2006, 2007, 2009) у зоні Степу – 39,0 ц/га, Лісостепу – 34,6 ц/га, Полісся – 34,6 ц/га. Вміст жиру – в межах 44-45%, білку – в межах 19,9-23,5%. Вміст ерукової кислоти – в межах 0,1-0,3%, глюкозинолатів – в межах 0,6-0,9%.

Стійкість до вилягання – 8,3-9,0; посухи – 8,4-9,0; осипання – 7,3-8,3 бала.

Зимостійкість – в межах 8,3-9,0 балів.