

висотою, за кольором стебла – зелена, восковий наліт на стеблі відсутній. Форма суцвіття китиця, забарвлення пелюсток квіткі блідо-жовті, стручок довгий за довжиною, за довжиною зубця – короткий, за тривалістю вегетаційного періоду сорт скоростиглий.

За даними заявника урожайність 2,5 ц/га, вміст ефірної олії 45 %, вміст ерукової кислоти 1,0 %, ураження переноспорозом 2 %.

Гірчиця біла

® 08092002 Запоріжанка

Зона вирощування: Лісостеп.

Заявник: Інститут опійних культур Української академії аграрних наук

Рослина за висотою (під час цвітіння) із середньої до високої, за загальною довжиною – довга, інтенсивність зеленого забарвлення листка помірна, кількість часток листка (за повного розвитку) – середня, зубчатість краю листка – помірна, довжина черешка листка довга, листок за шириною – широкий, за довжиною – довгий, час цвітіння середній, інтенсивність жовтого забарвлення пелюсток квіткі світла, довжина пелюсток квіткі довга, ширина від середньої до широкої, стручок за довжиною середній, стручок – довжина гачка – середній, довжина ніжки стручка середня, кількість насінин у стручку середня, маса 1000 насінин велика, сім'ядоля за довжиною від середньої до довгої, за шириною – широка, ерукова кислота в насінні наявна. Диплоїд.

За даними заявника урожайність насіння (за 12% вологості) 2,0 т/га, вміст глюкозинолатів 25 мколь, вміст олії 30 %, вміст ерукової кислоти 7,0 %. Стійкість до бактеріозу та переноспорозу висока (по 7 балів), стійкість до квіткогризу 9 балів, стійкість до ураження пильщиком і жуком-блішкою по 7 балів. Напрям використання – на насіння, фураж і сидерати.

09092002 Ослава

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп,

Степ

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Рослина за висотою (під час цвітіння) висока, інтенсивність зеленого забарвлення листка помірна, кількість часток листка (за повного розвитку) – середня, зубчатість краю листка – помірна, довжина черешка листка довга, листок за шириною – широкий, за довжиною – довгий, час цвітіння ранній, інтенсивність жовтого забарвлення пелюсток квіткі помірна, довжина і ширина пелюсток квіткі середня, стручок за довжиною короткий, стручок – довжина гачка – довгий, довжина ніжки стручка середня, кількість насінин в стручку середня, маса 1000 насінин середня, сім'ядоля за довжиною середня, за шириною – середня, ерукова кислота в насінні наявна. Диплоїд.

За даними заявника урожайність насіння (за 12% вологості) 2,8 т/га, вміст білка 27,5 %, вміст глюкозинолатів 55 мколь, вміст олії 26 %, вміст ерукової кислоти 18,5 %. Стійкість до бактеріозу та переноспорозу по 1 балу, пошкодження квіткогризом і пильщиком по 3 бали, стійкість до ураження жуком-блішкою 5 балів. Напрям використання – на насіння, фураж і сидерати.

Мак снотворний

05095001 Альмадін

Зона вирощування: Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідна аграрна компанія "Агромак"

Опушення та білі плями листової розетки відсутні. Стебло: діаметр розетки середній, розгалуження стебла подвоєне, за довжиною середнє, антоціанове забарвлення (між коробочкою та верхівкою стебла) відсутнє, опушеність – середня. Стебловий листок з верхньої сторони має зелений колір з жовтуватим відтінком, восковий наліт слабкий, надрізи країв стеблових листків з верхньої сторони мають зелений колір з жовтуватим відтінком, восковий наліт слабкий, надрізи країв стеблових листків з верхньої сторони мають зелений колір з жовтуватим відтінком, восковий наліт слабкий, надрізи країв стеблових листків з верхньої сторони мають зелений колір з жовтуватим відтінком, восковий наліт слабкий, надрізи країв стеблових листків з верхньої сторони мають зелений колір з жовтуватим відтінком. Час цвітіння середній. Коробочка: еліптичної форми (у забарвлення плям слабка, колір тичинки білий, розсічення пелюстки відсутні).