

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,0-9,0; бактеріозом – 8,0-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 7,0-9,0 балів.

06016015 Хенрі

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х

Степ, Лісостеп

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - вузька, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 30,5 ц/га, Лісостепу – 35,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,2-44,4%, білку – в межах 22,8-23,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,4-8,8; посухи – 8,3-8,4; осипання – 6,8-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 6,5-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,6-8,8 бала.

Ріпак ярий

06016039 71 20 Кл

Заявник: Монсанта Технології ЛТД

Лісостеп, Полісся

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з малою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина за висотою висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 21,5 ц/га, Полісся – 19,2 ц/га. Вміст жиру – 44,5%. Вміст білку – 24,6%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкий до вилягання та посухи. Середньостійкий до осипання.

® 08016004 Белінда

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Степ, Лісостеп, Полісся

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною довгі, за шириною широкі. Зубчастість краю листка помірна, листок середній за довжиною і вузький за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з середньою довжиною зубця. Час цвітіння пізній.

Урожайність за роки випробування (2008-2009) у зоні Степу – 15,9 ц/га, Лісостепу – 24,3 ц/га, Полісся – 22,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 45,0-45,3%, білку – в межах 24,2-25,8%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,5-0,6%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,3-9,0; посухи – в межах 6,4-8,3; осипання – в межах 6,9-8,3 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 7,8-9,0 балів.

06016046 Делайт

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Степ, Лісостеп, Полісся

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною вузькі. Зубчастість краю листка слабка, листок середній за