

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,0-9,0; бактеріозом – 8,0-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 7,0-9,0 балів.

06016015 Хенрі

Заявник: Заатбау Лінц рег.Ген.м.б.Х

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - вузька, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - короткий. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною середній. Середній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 30,5 ц/га, Лісостепу – 35,9 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,2-44,4%, білку – в межах 22,8-23,7%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%, глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкість до вилягання – 8,4-8,8; посухи – 8,3-8,4; осипання – 6,8-7,4 бала.

Зимостійкість – в межах 6,5-8,4 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 8,8-9,0; бактеріозом – 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – 8,6-8,8 бала.

Ріпак ярий

06016039 71 20 Кл

Заявник: Монсанта Технолоджі ЛТД

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середня, за довжиною - середня. Зубчастість краю листка помірна. Листок короткий з малою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина за висотою висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Ранній час цвітіння.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Лісостепу – 21,5 ц/га, Полісся – 19,2 ц/га. Вміст жиру – 44,5%. Вміст білку – 24,6%. Вміст ерукової кислоти – 0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкий до вилягання та посухи. Середньостійкий до осипання.

® 08016004 Белінда

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною довгі, за шириною широкі. Зубчастість краю листка помірна, листок середній за довжиною і вузький за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з середньою довжиною зубця. Час цвітіння пізній.

Урожайність за роки випробування (2008-2009) у зоні Степу – 15,9 ц/га, Лісостепу – 24,3 ц/га, Полісся – 22,8 ц/га. Вміст жиру – в межах 45,0-45,3%, білку – в межах 24,2-25,8%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,5-0,6%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,3-9,0; посухи – в межах 6,4-8,3; осипання – в межах 6,9-8,3 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 7,8-9,0 балів.

06016046 Делайт

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною вузькі. Зубчастість краю листка слабка, листок середній за

Степ, Лісостеп

Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

довжиною і середній за шириною, мала кількість часток. Довжина черешка листка короткий. Рослина коротка за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 18,5 ц/га, Лісостепу – 24,0 ц/га, Полісся – 22,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-45,0%, білку – в межах 23,3-24,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,3-9,0; посухи – в межах 7,8-8,2; осипання – в межах 7,2-8,3 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – в межах 8,3-9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,8-9,0 балів.

07016099 Ерлібьорд

Заявник: Маїсадур Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 17,4 ц/га, Лісостепу – 20,9 ц/га, Полісся – 20,3 ц/га. Вміст жиру – у межах 44-45%. Вміст білку – 24-26%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкий до вилягання. Середньостійкий до посухи та осипання.

® 07016059 ЕС Катя

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середні, за довжиною - середні. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 15,9 ц/га, Лісостепу – 19,8 ц/га, Полісся – 17,6 ц/га. Вміст жиру – 45%. Вміст білку – у межах 23-25%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%. Вміст глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкий до вилягання. Середньостійкий до посухи та осипання.

® 06016041 Зоня КЛ

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна, листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з коротким зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 16,7 ц/га, Лісостепу – 22,6 ц/га, Полісся – 21,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,5-44,9%, білку – в межах 23,8-25,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,5-0,7%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,0-9,0; посухи – в межах 7,7-8,2; осипання – в межах 7,2-8,2 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,3-9,0 балів.

07016055 Калібр

Заявник: Норддойче Пфланценцухт Ганс-Георг Лембке КГ

Степ, Лісостеп, Полісся