

довжиною і середній за шириною, мала кількість часток. Довжина черешка листка короткий. Рослина коротка за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 18,5 ц/га, Лісостепу – 24,0 ц/га, Полісся – 22,1 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,4-45,0%, білку – в межах 23,3-24,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,7%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,3-9,0; посухи – в межах 7,8-8,2; осипання – в межах 7,2-8,3 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – в межах 8,3-9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,8-9,0 балів.

07016099 Ерлібьорд

Заявник: Маїсадур Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 17,4 ц/га, Лісостепу – 20,9 ц/га, Полісся – 20,3 ц/га. Вміст жиру – у межах 44-45%. Вміст білку – 24-26%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%. Вміст глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкий до вилягання. Середньостійкий до посухи та осипання.

® 07016059 ЕС Катя

Заявник: Євраліс Семанс

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - середні, за довжиною - середні. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина висока. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок довгий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 15,9 ц/га, Лісостепу – 19,8 ц/га, Полісся – 17,6 ц/га. Вміст жиру – 45%. Вміст білку – у межах 23-25%. Вміст ерукової кислоти – 0,0%. Вміст глюкозинолатів – 0,6%.

Стійкий до вилягання. Середньостійкий до посухи та осипання.

® 06016041 Зоня КЛ

Заявник: Норддойче Пфланцензукт Ганс-Георг Лембке КГ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна, листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з коротким зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу – 16,7 ц/га, Лісостепу – 22,6 ц/га, Полісся – 21,7 ц/га. Вміст жиру – в межах 44,5-44,9%, білку – в межах 23,8-25,5%. Вміст ерукової кислоти – 0,0-0,1%, глюкозинолатів – 0,5-0,7%.

Стійкість до вилягання – в межах 8,0-9,0; посухи – в межах 7,7-8,2; осипання – в межах 7,2-8,2 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом – 9,0 балів; бактеріозом – 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом – в межах 8,3-9,0 балів.

07016055 Калібр

Заявник: Норддойче Пфланцензукт Ганс-Георг Лембке КГ

Степ, Лісостеп, Полісся