

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок довгий з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - коротка. Рослина довга. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий. Пізній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - відсутня або дуже слабка.

Урожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу - 13,2 ц/га, Лісостепу - 18,1 ц/га, Полісся - 13,9 ц/га. Вміст жиру - у межах 44-45%. Вміст білку - 24-26%. Вміст ерукової кислоти - 0,0-0,1%. Вміст глюкозинолатів - 0,5-0,6%.
Стійкий до вилягання. Середньостійкий до посухи та осипання.

06016047 Ларісса

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною короткі, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна, листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок середній за довжиною з середнім зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу - 16,0 ц/га, Лісостепу - 22,4 ц/га, Полісся - 20,5 ц/га. Вміст жиру - в межах 44,6-45,6%, білку - в межах 23,2-24,3%. Вміст ерукової кислоти - 0,0-0,1%, глюкозинолатів - 0,4-0,6%.

Стійкість до вилягання - в межах 8,3-9,0; посухи - в межах 6,9-8,3; осипання - в межах 7,0-8,6 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0 балів; бактеріозом - в межах 8,8-9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - в межах 8,6-9,0 балів.

® 08016006 Мірко КЛ

Заявник: Рапс ГБР Заатцухт Лундсгаард

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за довжиною середні, за шириною середні. Зубчастість краю листка помірна, листок середній за довжиною і середній за шириною, середня кількість часток. Довжина черешка листка середній. Рослина середня за висотою. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок короткий за довжиною з довгим зубцем. Час цвітіння ранній.

Урожайність за роки випробування (2008-2009) у зоні Лісостепу - 21,4 ц/га, Полісся - 20,6 ц/га. Вміст жиру - в межах 45,1-45,3%, білку - в межах 24,6-25,4%. Вміст ерукової кислоти - 0,1%, глюкозинолатів - 0,5-0,6%.

Стійкість до вилягання - в межах 8,3-8,4; посухи - в межах 8,0-8,2; осипання - в межах 6,9-7,0 бала.

Стійкість до ураження пероноспорозом - 9,0 балів; бактеріозом - 9,0 балів. Стійкість до пошкодження ріпаковим квіткоїдом - 9,0 балів.

06016045 ПР45Г73

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Насіння без ерукової кислоти. Сім'ядолі за шириною - широка, за довжиною - довга. Зубчастість краю листка помірна. Листок середній з середньою кількістю часток. Довжина черешка листка - середня. Рослина середньої висоти. Колір пелюсток квітки жовтий. Стручок за довжиною короткий. Середній час цвітіння. Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби - дуже сильна.

Урожайність за роки випробування (2007-2009) у зоні Степу - 15,0 ц/га, Лісостепу - 21,7 ц/га, Полісся - 21,5 ц/га. Вміст жиру - у межах 44,7-45,2%. Вміст білку - у межах 23,0-24,4%. Вміст ерукової кислоти - 0,0-0,1%. Вміст глюкозинолатів - 0,6-0,7%.

Стійкий до вилягання та посухи. Середньостійкий до осипання.

06016050 ПР45Г72

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Степ, Лісостеп, Полісся

Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся