

Льон звичайний, довгунець

08015001 Агата

Зона вирощування: Полісся, Лісостеп,
Степ

Заявник: Лімагрейн Адванта Нідерланд Б.В.

Рослина за висотою, враховуючи гілочки (під час цвітіння) від середньої до високої, стебло за довжиною, не враховуючи коротких гілочок (під час повного розвитку) від середнього до довгого. Розмір віночка квітки (на початку цвітіння) середній, плямистість чашолисток (у фазі пуп'янка) відсутня або дуже слабка, колір пелюстки (у фазі пуп'янка перед розкриванням квітки) блакитно-фіолетовий, колір віночка пелюстки (за повного цвітіння) блакитний, у пелюстки відсутній поздовжній згин, колір дистальної частини нитки тичинки (одразу після розкриття квітки) блакитний, пиляк – голубуватого кольору, основа стовпчика маточки – блакитного кольору. Розмір коробочки від малої до середньої, вічатість несправжніх перетинок коробочки відсутня. Маса 1000 насінин мала, насіння помірно-коричневого кольору. Час початку цвітіння середній.

За даними заявника урожайність насіння 380,0 ц/га, вміст усього волокна 34,2 %, вихід довгого волокна 19,7 %, середній номер довгого волокна 14, розривне навантаження волокна 18,2 кгс. Тривалість вегетаційного періоду 98 діб, стійкість до вилягання 2,5 бали, стійкість до основних хвороб і шкідників висока.

Коноплі посівні

® 09014001 Вікторія

Заявник: Інститут луб'яних культур Української академії аграрних наук

Форма сім'ядолей паростка видовжена, довжина більшої сім'ядолі велика, довжина гіпокотили мала, антоціанове забарвлення гіпокотили відсутнє. Рослина: забарвлення верхівки зелене, рослина однодомна, частка чоловічих квіток у суцвітті рослин від дуже малої до малої. Довжина черешка листка середня, кількість часток середня, центральна частка листка: за довжиною довга, за шириною – вузька, відношення довжини до ширини велике, довжина верхівки середня, кількість головних зубців мала. Суцвіття: довжина квітконіжки чоловічої квітки мала, ступінь компактності суцвіття середній, за довжиною – середнє, за шириною – вузьке, за формою – ромбічне. Забарвлення стебла під час досягання жовто-зелене, діаметр стебла середній, кількість міжвузлів на стеблі середня, довжина міжвузля середня, кількість листків на стеблі середня. Тривалість вегетаційного періоду короткий, загальний вміст волокна дуже високий, маса 1000 насінин середня, основне забарвлення оболонки насіння сіре, дуже багато насінин з мозаїчним забарвленням оболонки, інтенсивність прояву мозаїки насіння слабка, величина мозаїчних плям оболонки середня, вміст канабіноїдних сполук в рослині відсутній або дуже низький.

07013045 Беліно

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Степ, Лісостеп, Полісся

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова