

**07013001 Венера**

Заявник: Насіннєва компанія Аурора с.п.а.

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 623,5 ц/га. Цукристість – 18,9%. Збір цукру з гектара – 119,7 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 4,7 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,7 бала.

**07013043 Геліос**

Степ, Лісостеп

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, наполовину заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 599,5 ц/га, Лісостепу – 563,8 ц/га. Цукристість відповідно – 17,4; 17,0%. Збір цукру з гектара відповідно – 104,2; 96,1 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,0; 6,6 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 8,0-8,3 бала.

**07013024 Дарія КВС**

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: КВС ЗААТ АГ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з сильною хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 657,4 ц/га, Лісостепу – 572,1 ц/га, Полісся – 602,0 ц/га. Цукристість відповідно – 17,6; 17,8; 17,4%. Збір цукру з гектара відповідно – 115,6; 102,3; 104,7 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,5%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,5; 7,2; 3,8 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,5 бала.

**07013040 Ельдорадо**

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок довгий. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-

зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середньої довжини, циліндрично-конічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 606,6 ц/га, Лісостепу – 587,3 ц/га, Полісся – 608,1 ц/га. Цукристість відповідно – 16,8; 17,3; 17,6%. Збір цукру з гектара відповідно – 101,6; 101,7; 106,3 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 1,2; 1,3; 1,3%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренієм. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,0; 7,2; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,6-8,2 бала.

Полісся

### ® 07013015 Злука

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок зелений, за шириною вузький з білуватим забарвленням в основі. Коренеплід малого розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений в ґрунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 565,8 ц/га. Цукристість – 18,6%. Збір цукру з гектара – 106,5 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренієм. Стійкість до церкоспорозу – 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,2 бала.

Степ, Полісся

### 07013035 Зум

Заявник: Насіннєва компанія Ласен Сідс Лімітед

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка мала за розміром, з сильно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок червонуватий, за шириною дуже вузький з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід малого розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 543,6 ц/га, Полісся – 556,6 ц/га. Цукристість відповідно – 17,8; 19,9%. Збір цукру з гектара відповідно – 96,5; 111,6 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,6%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренієм. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,5; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,2-8,0 бала.

Степ

### 07013009 Компроміс

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 590,0 ц/га. Цукристість – 16,3%. Збір цукру з гектара – 96,1 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренієм. Стійкість до церкоспорозу – 6,0 бала. Придатність до механізованого збирання – 8,5 бала.