

зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середньої довжини, циліндрично-конічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 606,6 ц/га, Лісостепу – 587,3 ц/га, Полісся – 608,1 ц/га. Цукристість відповідно – 16,8; 17,3; 17,6%. Збір цукру з гектара відповідно – 101,6; 101,7; 106,3 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 1,2; 1,3; 1,3%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,0; 7,2; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,6-8,2 бала.

® 07013015 Злука

Заявник: Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук

Трипліод. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок зелений, за шириною вузький з білуватим зеленим забарвленням в основі. Коренеплід малого розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений в ґрунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 565,8 ц/га. Цукристість – 18,6%. Збір цукру з гектара – 106,5 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,2 бала.

07013035 Зум

Заявник: Насіннєва компанія Ласн Сідс Лімітед

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка мала за розміром, з сильно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок червонуватий, за шириною дуже вузький з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід малого розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 543,6 ц/га, Полісся – 556,6 ц/га. Цукристість відповідно – 17,8; 19,9%. Збір цукру з гектара відповідно – 96,5; 111,6 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,6%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,5; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,2-8,0 бала.

07013009 Компроміс

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з жовтуватим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, цширококонічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 590,0 ц/га. Цукристість – 16,3%. Збір цукру з гектара – 96,1 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу – 6,0 бала. Придатність до механізованого збирання – 8,5 бала.