

білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, заглиблений в ґрунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 557,3 ц/га, Полісся – 656,1 ц/га. Цукристість – 17,1%. Збір цукру з гектара відповідно – 95,5; 112,8 ц. Втрати цукру в мелясі 1,6%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,7; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,6-8,6 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

07013034 Родос

Заявник:

Насіннева компанія Аурора с.п.а.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка мала за розміром, з сильною хвилястістю країв, сильно гофрована. Черешок білий, за шириною дуже вузький з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 588,0 ц/га, Лісостепу – 561,4 ц/га, Полісся – 532,9 ц/га. Цукристість відповідно – 18,0; 17,9; 20,1%. Збір цукру з гектара відповідно – 105,3; 100,5; 107,8 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,6%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,5; 6,8; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,5 бала.

Лісостеп, Полісся

07013038 Сілента

Заявник:

Синтента Кроп Протекшн АГ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напівпохила. Листок довгий. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною вузький з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та довжини, ширококонічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 561,0 ц/га, Полісся – 604,4 ц/га. Цукристість відповідно – 17,9; 17,8%. Збір цукру з гектара відповідно – 92,5; 95,7 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 1,4; 1,5%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,5; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,6-8,5 бала.

Степ, Лісостеп

07013022 Слатка КВС

Заявник:

КВС ЗААТ АГ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напівпохила. Листок короткий. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, широкий з світло-оранжевим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середній за довжиною, циліндрично-конічної форми, повністю заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 610,1 ц/га, Лісостепу – 566,8 ц/га. Цукристість відповідно – 18,2; 17,7%. Збір цукру з гектара відповідно – 110,9; 100,6 ц. Втрати цукру в мелясі відповідно – 1,8; 2,0%.

Гібрид стійкий до цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 6,7 бала. Придатність до

механізованого збирання у межах 7,5-8,3 бала.

06013038 Сідерал

Полісся

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, на половину заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 644,1 ц/га. Цукристість – 16,9%. Збір цукру з гектара – 109,3 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,7%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренейдом. Стійкість до церкоспорозу – 5,6 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,1 бала.

07013003 Тінкер

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Марібо Сід ГмБХ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки – вертикальна. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за розміром, з помірно хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною зузський з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, ширококонічної форми, заглиблений в ґрунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 574,3 ц/га, Лісостепу – 578,7 ц/га, Полісся – 657,6 ц/га. Цукристість відповідно – 16,6; 17,1; 18,2%. Збір цукру з гектара відповідно – 95,6; 99,5; 118,1 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренейдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 5,0; 8,0; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 4,8-8,2 бала.

07013004 Туніка

Лісостеп, Полісся

Заявник: Марібо Сід ГмБХ

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок короткий. Листкова пластинка коротка за розміром, з помірно хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною дуже вузький з білувато-зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та короткий за довжиною, вузькоконічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 575,0 ц/га, Полісся – 626,7 ц/га. Цукр істий відповідно – 17,1; 17,6%. Збір цукру з гектара відповідно – 98,5; 109,6 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренейдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,4; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,0-8,3 бала.

06013037 Урал

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато-