

механізованого збирання у межах 7,5-8,3 бала.

06013038 Сідерал

Полісся

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білуватозеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, на половину заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 644,1 ц/га. Цукристість – 16,9%. Збір цукру з гектара – 109,3 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,7%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренейдом. Стійкість до церкоспорозу – 5,6 бала. Придатність до механізованого збирання – 5,1 бала.

07013003 Тінкер

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Марібо Сід ГмбХ

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з слабким антоціановим забарвленням. Тип розетки – вертикальна. Листок короткий за довжиною. Листкова пластинка коротка за розміром, з помірно хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною зуський з білуватозеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру, ширококонічної форми, заглиблений в ґрунт на 3/4.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 574,3 ц/га, Лісостепу – 578,7 ц/га, Полісся – 657,6 ц/га. Цукристість відповідно – 16,6; 17,1; 18,2%. Збір цукру з гектара відповідно – 95,6; 99,5; 118,1 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренейдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 5,0; 8,0; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 4,8-8,2 бала.

07013004 Туніка

Лісостеп, Полісся

Заявник: Марібо Сід ГмбХ

Триплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок короткий. Листкова пластинка коротка за розміром, з помірно хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною дуже вузький з білуватозеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та короткий за довжиною, вузькоконічної форми, на 3/4 заглиблений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 575,0 ц/га, Полісся – 626,7 ц/га. Цукр істість відповідно – 17,1; 17,6%. Збір цукру з гектара відповідно – 98,5; 109,6 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,9%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренейдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,4; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,0-8,3 бала.

06013037 Урал

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: САС Флоримонд Депре Вев е Фіс

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білуватозеленим забарвленням в основі.

зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, ширококонічної форми, заглиболений наполовину в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 569,3 ц/га, Лісостепу – 575,5 ц/га, Полісся – 622,9 ц/га. Цукристість відповідно – 16,7; 16,5; 16,9%. Збір цукру з гектара відповідно – 99,2; 95,6; 104,9 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,8%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 5,4; 7,1; 5,0 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,4-8,1 бала.

Степ, Полісся

07013002 Феррара

Заявник: Насіннева компанія Аурора с.п.а.

Трипліод. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – напіврозлога. Листок середньої довжини. Листкова пластинка середня за розміром, з помірно хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середньої довжини, ширококонічної форми, повністю заглиболений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 567,8 ц/га, Полісся – 590,8 ц/га. Цукристість відповідно – 17,1; 19,5%. Збір цукру з гектара відповідно – 96,8; 115,8 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,6%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 6,0; 4,7 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,7-7,3 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

07013041 Шейен

Заявник: СесВандерхаве Н.Б./С.А.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток без антоціанового забарвлення. Тип розетки – розлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з слабкою хвилястістю країв, слабо гофрована. Черешок зелений, за шириною широкий з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід великого розміру та середній за довжиною, циліндрично-конічної форми, на 3/4 заглиболений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 551,2 ц/га, Лісостепу – 544,3 ц/га, Полісся – 608,0 ц/га. Цукристість відповідно – 17,3; 17,3; 18,3%. Збір цукру з гектара відповідно – 95,4; 97,0; 112,7 ц. Втрати цукру в мелясі – 1,4%.

Гібрид стійкий до цвітущості та слабо уражується коренеїдом. Стійкість до церкоспорозу відповідно – 7,5; 7,7; 5,8 бала. Придатність до механізованого збирання у межах 5,2-8,3 бала.

Степ, Лісостеп, Полісся

07013020 Яносік

Заявник: Кутновська Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о.

Диплоїд. Клубочок – одноростковий. Паросток з антоціановим забарвленням. Тип розетки – напіврозлога. Листок середній. Листкова пластинка середня за розміром, з сильною хвилястістю країв, помірно гофрована. Черешок зелений, за шириною середній з білувато зеленим забарвленням в основі. Коренеплід середнього розміру та середній за довжиною, цширококонічної форми, повністю заглиболений в ґрунт.

Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 565,6 ц/га, Лісостепу – 574,6 ц/га, Полісся – 591,6 ц/га. Цукристість – 17,4%. Збір цукру з гектара відповідно – 98,3; 100,0; 102,4 ц. Втрати цукру в 361