

Костриця лучна

® 07054001 Марінца

Л,П

Заявник: Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Національної академії аграрних наук

Диплоїд. Рослина: габітус (восени в рік посіву) – напівпрямий, тенденція утворення суцвіття в рік посіву – слабка, час появи суцвіття ранній.

Габітус при появі суцвіття – напівпрямий, природна висота при появі суцвіття – довга. Інтенсивність зеленого кольору листка протягом вегетаційного періоду темна. Пропорцевий листок широкий, довгий. Стебло: довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – довге. Довжина суцвіття, коли воно повністю сформоване – середнє.

Сорт характеризується стійкістю до вилягання, посухи, ураження хворобами. Зимостійкий. Має високу кущистість. Середня урожайність сухої речовини -Л- 40,6ц/га, П-49,6. Вегетаційний період - Л-73дн, П-79дн. Висота рослини -Л-92,1,П- 90,3. Залистяність – Л-42,0, П-51,9%. Вміст сирого протеїну - Л-11,3 %, П-10,2%. Вміст клітковини – Л-30,2, П-28,3 %. Середньостиглий, сінокісно-пасовищного типу.

Пажитниця багаторічна

® 05062010 Мрія

Лісостеп

Заявник: Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Диплоїд. Габітус восени в рік висіву проміжний, тенденція до утворення суцвіть відсутня або дуже слабка.

Навесні габітус проміжний. Листок середній за розміром. Час викидання суцвіть ранній. Суцвіття має середню багату колосків.

Середня урожайність сухої речовини - 46,6ц/га. Гарантована прибавка - 1,9ц/га, 4,07%. Вміст сирого протеїну – 11,0%. Вміст клітковини - 27,0,0%. Сорт середньостиглий, має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Висота рослини - 68,0см. Днів до достигання 72,7. Залистяність 52,0%.. Напрямок використання - сінокісно-пасовищний.

® 07062001 Осип

Л,П

Заявник: Передкарпатська дослідна станція Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук

Диплоїд. Габітус восени в рік висіву проміжний, тенденція до утворення суцвіть відсутня або дуже слабка.

Навесні габітус проміжний. Листок середній за розміром. Час викидання суцвіть дуже пізній. Суцвіття має середню кількість колосків.

Середня урожайність сухої речовини - Л-47,6ц/га, П-47,8ц/га. Вміст сирого протеїну Л – 12,9%, П-11,3. Вміст клітковини - Л-27,7%, П-28,4. %. Сорт середньоранній має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Вегетаційний період - Л-83дн, П-77дн. Висота рослини -Л-73,6см, П- 66,0см. Залистяність складає - Л-45,50%, П-55,3%. Років використання - 5. Напрямок використання - сінокіснопасовищний та лукопасовищний.

Горошок (Вика яра)

® 06047001 Владіслава

Лісостеп

Заявник: Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Сіявці рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають слабе антоціанове забарвлення основи стебла, світло-зелене листя.

Час початку цвітіння у сорту середній. На цей час верхнє міжвузля стебла опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або