

Костриця лучна

® 07054001 Марінца

Л,П

Заявник:

Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Національної академії аграрних наук

Диплоїд. Рослина: габітус (восени в рік посіву) – напівпрямий, тенденція утворення суцвіття в рік посіву – слабка, час появи суцвіття ранній.

Габітус при появі суцвіття – напівпрямий, природна висота при появі суцвіття – довга. Інтенсивність зеленого кольору листка протягом вегетаційного періоду темна. Пропорцевий листок широкий, довгий. Стебло: довжина найдовшого стебла (включаючи суцвіття, коли вони повністю сформовані) – довге. Довжина суцвіття, коли воно повністю сформоване – середнє.

Сорт характеризується стійкістю до вилягання, посухи, ураження хворобами. Зимостійкий. Має високу кущистість. Середня урожайність сухої речовини -Л- 40,6ц/га, П-49,6. Вегетаційний період - Л-73дн, П-79дн. Висота рослини -Л-92,1,П- 90,3. Залистяність – Л-42,0, П-51,9%. Вміст сирого протеїну - Л-11,3 %, П-10,2%. Вміст клітковини – Л-30,2, П-28,3 %. Середньостиглий, сінокісно-пасовищного типу.

® 05062010 Мрія

Лісостеп

Заявник:

Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Диплоїд. Габітус восени в рік висіву проміжний, тенденція до утворення суцвіть відсутня або дуже слабка.

Навесні габітус проміжний. Листок середній за розміром. Час викидання суцвіть ранній. Суцвіття має середню багато колосків.

Середня урожайність сухої речовини - 46,6ц/га. Гарантована прибавка - 1,9ц/га, 4,07%. Вміст сирого протеїну – 11,0%. Вміст клітковини - 27,0,0%. Сорт середньостиглий, має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Висота рослини - 68,0см. Днів до достигання 72,7. Залистяність 52,0%..Напряв використання - сінокісно-пасовищний.

® 07062001 Осип

Л,П

Заявник:

Передкарпатська дослідна станція Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук

Диплоїд. Габітус восени в рік висіву проміжний, тенденція до утворення суцвіть відсутня або дуже слабка.

Навесні габітус проміжний. Листок середній за розміром. Час викидання суцвіть дуже пізній. Суцвіття має середню кількість колосків.

Середня урожайність сухої речовини - Л-47,6ц/га, П-47,8ц/га. Вміст сирого протеїну Л – 12,9%, П-11,3. Вміст клітковини - Л-27,7%, П-28,4. % . Сорт середньоранній має непогані показники посухостійкості, зимостійкості та стійкості до хвороб. Вегетаційний період - Л-83дн, П-77дн. Висота рослини -Л-73,6см, П- 66,0см. Залистяність складає - Л-45,50%, П-55,3%. Років використання - 5. Напряв використання - сінокіснопасовищний та лукопасовищний.

Горошок (Вика яра)

® 06047001 Владіслава

Лісостеп

Заявник:

Вінницька державна сільськогосподарська дослідна станція Української академії аграрних наук

Сіявці рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають слабе антоціанове забарвлення основи стебла, світло-зелене листя.

Час початку цвітіння у сорту середній. На цей час верхнє міжвузля стебла опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або

дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини пряма, листочки за шириною вузькі, антоціанове забарвлення залозок на прилистках відсутнє або дуже слабке, квітка має темно-фіолетове забарвлення паруса.

У фазі повного розвитку боби мають слабке або відсутнє опушення, середню довжину і ширину, короткий дзьобик та середню кількість насінних зачатків.

За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння дрібне за розміром та округле за формою. Воно має основне сіро-коричневе забарвлення насінної оболонки коричнева орнаментация відсутня. Вираження коричневої орнаментации дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментация крапки і плями.

Середня урожайність: сухої речовини - Лісостеп - 46,9ц/га(гарантована прибавка - 0,4 ц/га або 0,8 %); насіння - Лісостеп - 18,9 ц/га. Вегетаційний період 68,6 дн. Вміст сирого протеїну - 20,0 %. Сорт достатньо посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Залистяність - 54,0 - 69,0 % . Напряв використання - кормовий.

® 06047002 Ліла

Заявник: Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломієць Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Сіянци рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають слабке антоціанове забарвлення основи стебла, світло-зелене листя. Час початку цвітіння у сорту середній. На цей час верхнє міжвузля стебла опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини пряма, листочки за шириною вузькі, антоціанове забарвлення залозок на прилистках відсутнє або дуже слабке, квітка має фіолетове забарвлення паруса.

У фазі повного розвитку боби мають слабке, середню довжину і ширину, середній дзьобик та середню кількість насінних зачатків.

За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння дрібне за формою та округле за формою. Воно має основне сіро-зелене забарвлення насінної оболонки, коричнева орнаментация відсутня. Вираження коричневої орнаментации дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментация відсутня. Насіння має сірувато-коричневе забарвлення сім'ядолей.

Середня урожайність: сухої речовини - Лісостеп - 48,6ц/га(гарантована прибавка - 2,1 ц/га або 4,3 %); Полісся - 76,4 ц/га (гарантована прибавка - 6,5 ц/га або 8,5 %) насіння - Лісостеп - 18,7ц/га.. Вегетаційний період: Лісостеп -67,8 дн, Полісся - 69,4. Вміст сирого протеїну: Лісостеп -19,5 %, Полісся - 20,2%.. Сорт достатньо посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Залистяність - 54,0 - 68,5 % . Напряв використання - кормовий.

® 07050001 Медіно

Заявник:

Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Національної академії аграрних наук

Рослини сорту першого року життя мають високу схильність до цвітіння.

Рослини за висотою основної зеленої маси, напівпрями за габітусом, з помірним галузненням. Стебло довге, середньої товщини, немає антоціанового забарвлення та без опушення в середній його частині. Листя зелене, з сіро-зеленим забарвленням, середнє за довжиною, середньої товщини, має ланцетну форму.

Час початку цвітіння рослин і час повного їх цвітіння, а також і період від початку до повного цвітіння - середні. Суцвіття середньої довжини, веретеноподібної форми. Квітка світло-рожевого кольору з нерівномірним забарвленням. Бобик середнього розміру, з короткими зубчиками.

Сорт середньостиглий. Має високу посухостійкість та зимостійкість. Стійкий до вилягання. Ураженість хворобами незначна. Урожайність сухої речовини за роки випробування у зоні Лісостепу - 70,1 ц/га, П-64,6ц/га. Залистяність становила Л-52,3%,П-56,3%. Вегетаційний період -Л-70,0дн, П-74,0дн. Вміст сирого протеїну - Л-18,0%, П-16,2%.

Еспарцет

Л.П