

дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини пряма, листочки за шириною вузькі, антоціанове забарвлення залозок на прилистках відсутнє або дуже слабке, квітка має темно-фіолетове забарвлення паруса.

У фазі повного розвитку боби мають слабке або відсутнє опушення, середню довжину і ширину, короткий дзьобик та середню кількість насінних зачатків.

За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння дрібне за розміром та округле за формою. Воно має основне сіро-коричневе забарвлення насінної оболонки коричнева орнаментация відсутня. Виразення коричневої орнаментации дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментация крапки і плями.

Середня урожайність: сухої речовини - Лісостеп - 46,9ц/га(гарантована прибавка - 0,4 ц/га або 0,8 %); насіння - Лісостеп - 18,9 ц/га.Вегетаційний період 68,6 дн. Вміст сирого протеїну - 20,0 %. Сорт достатньо посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Залистяність - 54,0 - 69,0 %. Напряв використання - кормовий.

® 06047002 Ліла Лісостеп, Полісся

Заявник: Білоцерківська дослідно-селекційна станція ім. О.К. Коломійця Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук

Сіянци рослин сорту через 3-4 тижні після появи сходів мають слабке антоціанове забарвлення основи стебла, світло-зелене листя. Час початку цвітіння у сорту середній. На цей час верхнє міжвузля стебла опушене, антоціанове забарвлення пазух листків відсутнє, або дуже слабке, форма верхівки листочків на середній третині рослини пряма, листочки за шириною вузькі, антоціанове забарвлення залозок на прилистках відсутнє або дуже слабке, квітка має фіолетове забарвлення паруса.

У фазі повного розвитку боби мають слабке, середню довжину і ширину, середній дзьобик та середню кількість насінних зачатків.

За збирання, у фазі повної стиглості, сформоване насіння дрібне за розміром та округле за формою. Воно має основне сіро-зелене забарвлення насінної оболонки, коричнева орнаментация відсутня. Виразення коричневої орнаментации дуже слабке. Блакитно-чорна орнаментация відсутня.Насіння має сірувато-коричневе забарвлення сім'ядолей.

Середня урожайність: сухої речовини - Лісостеп - 48,6ц/га(гарантована прибавка - 2,1 ц/га або 4,3 %); Полісся - 76,4 ц/га (гарантована прибавка - 6,5 ц/га або 8,5 %) насіння - Лісостеп - 18,7ц/га.. Вегетаційний період: Лісостеп -67,8 дн, Полісся - 69,4.Вміст сирого протеїну: Лісостеп -19,5 %, Полісся - 20,2%.. Сорт достатньо посухостійкий, має високі показники стійкості до хвороб. Залистяність - 54,0 - 68,5 %. Напряв використання - кормовий.

Еспарцет

® 07050001 Медіно Л.П

Заявник: Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту цукрових буряків Національної академії аграрних наук

Рослини сорту першого року життя мають високу схильність до цвітіння.

Рослини за висотою основної зеленої маси , напівпрямі за габітусом, з помірним галузненням. Стебло довге, середньої товщини, немає антоціанового забарвлення та без опушення в середній його частині. Листя зелене, з сіро-зеленим забарвленням, середнє за довжиною, середньої товщини, має ланцетну форму.

Час початку цвітіння рослин і час повного їх цвітіння, а також і період від початку до повного цвітіння - середні. Суцвіття середньої довжини, веретеноподібної форми. Квітка світло-рожевого кольору з нерівномірним забарвленням. Бобик середнього розміру, з короткими зубчиками.

Сорт середньостиглий. Має високу посухостійкість та зимостійкість. Стійкий до вилягання. Ураженість хворобами незначна. Урожайність сухої речовини за роки випробування у зоні Лісостепу - 70,1 ц/га, П-64,6ц/га. Залистяність становила Л-52,3%,П-56,3%. Вегетаційний період -Л-70,0дн, П-74,0дн. Вміст сирого протеїну - Л-18,0%, П-16,2%.