

Конюшина лучна

® 06052001 Атлантіс

Заявник:

Норддойче Пфланцензукт Ганс-Георг Лембке КГ

Полісся

Тетраплоїд. Час цвітіння пізній. Рослина за висотою, товщиною стебла та кількістю міжвузль середня, з помірно щільністю опушення. Листок середній та з середньою частотою рослин з білими мітками. Забарвленням оболонки насіння жовте, суцвіття- фіолетове. Середня урожайність сухої речовини становить - 80,7ц/га. Гарантована прибавка - 9,3ц/га, 11,2%. Вміст сирого протеїну - 18,3% Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 47,5%.. Днів до досягання 80,7днів. Напряв використання сінокісно-пасовищний.

® 05052001 Полісянка

Заявник:

Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Полісся

Сорт тетраплоїдний. Рослини даного сорту характеризуються раннім часом цвітіння (час, коли на рослині зацвітає три головки). Найвище стебло рослини з головою через 1-2 тижні після цвітіння середнє, з середньою товщиною стебла, та з середньою кількістю міжвузлів. Опушення рослини на четвертому зверху міжвузлі відсутнє або дуже слабке. Центральний листочок верхнього нормально розвинутого листка під останньою квіткою на цей же час за довжиною характеризується проявом ознаки середній та шириною від вузького до середнього.

Частота рослин з білими мітками на листках досягає частой кількості. Забарвлення суцвіття рожеве. Забарвлення оболонки зібраного з досліду насіння багатобарвне.

Середня урожайність сухої речовини становить - 84,3ц/га. Гарантована прибавка - 10,7ц/га, 12,6%. Вміст сирого протеїну - 18,1% Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 43,0%.. Днів до досягання 87,0днів. Напряв використання сінокісно-пасовищний.

® 07052001 Уна

Заявник:

Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Полісся

Сорт диплоїдний. Рослини даного сорту характеризуються раннім часом цвітіння (час, коли на рослині зацвітає три головки). Найвище стебло рослини з головою через 1-2 тижні після цвітіння середнє, з середньою товщиною стебла, та з середньою кількістю міжвузлів. Опушення рослини на четвертому зверху міжвузлі нещільне. Центральний листочок верхнього нормально розвинутого листка під останньою квіткою на цей же час за довжиною характеризується проявом ознаки середній та середньою шириною. Частота рослин з білими мітками на листках досягає середньої кількості. Забарвлення суцвіття рожеве. Забарвлення оболонки зібраного з досліду насіння багатобарвне.

Середня урожайність сухої речовини становить - 79,7ц/га. Гарантована прибавка - 9,0ц/га, 10,8%. Вміст сирого протеїну - 17,8 % Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 46,7%.. Днів до досягання 79,7днів. Напряв використання сінокісно-пасовищний.

® 05058001 Алія

Заявник:

Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Лісостеп, Полісся

Люцерна посівна