

Конюшина лучна

® 06052001 Атлантіс

Заявник:

Норддойче Пфланцензухт Ганс-Георг Лембке КГ

Полісся

Тетраплоїд. Час цвітіння пізній. Рослина за висотою, товщиною стебла та кількістю міжвузль середня, з помірною щільністю опушення. Листок середній та з середньою частотою рослин з білими мітками. Забарвленням оболонки насіння жовте, суцвіття- фіолетове. Середня урожайність сухої речовини становить - 80,7ц/га. Гарантована прибавка - 9,3ц/га, 11,2%. Вміст сирого протеїну - 18,3% Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 47,5%.. Днів до досягання 80,7днів. Напряв використання сінокісно-пасовищний.

® 05052001 Полісянка

Заявник:

Національний науковий центр "Інститут землеробства Української академії аграрних наук"

Полісся

Сорт тетраплоїдний. Рослини даного сорту характеризуються раннім часом цвітіння (час, коли на рослині зацвітає три головки). Найвище стебло рослини з головою через 1-2 тижні після цвітіння середнє, з середньою товщиною стебла, та з середньою кількістю міжвузлів. Опушення рослини на четвертому зверху міжвузлі відсутнє або дуже слабке. Центральний листочок верхнього нормально розвинутого листка під останньою квіткою на цей же час за довжиною характеризується проявом ознаки середній та шириною від вузького до середнього.

Частота рослин з білими мітками на листках досягає частой кількості. Забарвлення суцвіття рожеве. Забарвлення оболонки зібраного з досліду насіння багатобарвне.

Середня урожайність сухої речовини становить - 84,3ц/га. Гарантована прибавка - 10,7ц/га, 12,6%. Вміст сирого протеїну - 18,1% Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 43,0%.. Днів до досягання 87,0днів. Напряв використання сінокісно-пасовищний.

® 07052001 Уна

Заявник:

Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Полісся

Сорт диплоїдний. Рослини даного сорту характеризуються раннім часом цвітіння (час, коли на рослині зацвітає три головки). Найвище стебло рослини з головою через 1-2 тижні після цвітіння середнє, з середньою товщиною стебла, та з середньою кількістю міжвузлів. Опушення рослини на четвертому зверху міжвузлі нещільне. Центральний листочок верхнього нормально розвинутого листка під останньою квіткою на цей же час за довжиною характеризується проявом ознаки середній та середньою шириною. Частота рослин з білими мітками на листках досягає середньої кількості. Забарвлення суцвіття рожеве. Забарвлення оболонки зібраного з досліду насіння багатобарвне.

Середня урожайність сухої речовини становить - 79,7ц/га. Гарантована прибавка - 9,0ц/га, 10,8%. Вміст сирого протеїну - 17,8 % Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 46,7%.. Днів до досягання 79,7днів. Напряв використання сінокісно-пасовищний.

® 05058001 Алія

Заявник:

Носівська селекційна дослідна станція Чернігівського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Лісостеп, Полісся

Люцерна посівна

Рослина від низької до середньої (через два тижні після осіннього рівнодення) та середня весною. Куш напівпрямий, листки помірно зеленого забарвлення, центральний листочок довгий, час цвітіння середній. Низька частота рослин з дуже темними синьо-фіолетовими квітками, дуже низька – зі змішаними, кремовими, білими та жовтими квітками. Рослина за довжиною та висотою середня з дуже низькою стійкістю до вертицильозного в'янення.

Середня урожайність сухої речовини становить: Лісостеп - 138,8ц/га, Полісся - 150,7ц/га. Гарантована прибавка: Лісостеп - 27,7ц/га, 19,9%, Полісся - 21,4ц/га, 14,2%. Вміст сирого протеїну: Лісостеп - 16,7%, Полісся - 20,7%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність: Лісостеп - 42,0%, Полісся - 40,3%. Днів до досягання: Лісостеп - 88,0 днів, Полісся - 57,0 днів. Напряму використання сінокісно-пасовищний.

Степ

® 07058001 Банат ВС

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сади

Висота рослини від середньої до високої. Габітус проміжний. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, середнього розміру. Квітка середньою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками відсутня або дуже низька. Час початку цвітіння від раннього до середнього. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить - 79,0ц/га, Гарантована прибавка: 3,2ц/га, 4,05%. Вміст сирого протеїну - 17,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 59,0%. Днів до досягання - 80,0 дн. Напряму використання сінокісно-пасовищний.

Лісостеп

® 05058002 Зоряна

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Висота рослини середня. Габітус прямий. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, листок за довжиною від середнього до довгого. Квітка з низькою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками відсутня або дуже низька. Час початку цвітіння середній. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить - 150,5ц/га, Гарантована прибавка: 39,4ц/га, 26,1%. Вміст сирого протеїну - 22,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 43,0%. Днів до досягання - 88,0 дн. Напряму використання сінокісно-пасовищний.

Степ, Полісся

® 06058001 Синюха

Заявник: Інститут юрмів Української академії аграрних наук

Висота рослини від середньої до високої. Габітус напівпрямий. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, середнього розміру. Квітка середньою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками низька. Час початку цвітіння від раннього до середнього. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить: Степ - 80,0ц/га, Полісся - 163,3ц/га. Гарантована прибавка: Степ - 4,2ц/га, 5,25%, Полісся - 34,0ц/га, 20,8%. Вміст сирого протеїну: Степ - 18,0%, Полісся - 18,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність: Степ - 61,0%, Полісся - 40,0%. Днів до досягання: Степ - 80,0 днів, Полісся - 56,5 днів. Напряму використання сінокісно-пасовищний.

Щириця

08099002 Пальміра