

Рослина від низької до середньої (через два тижні після осіннього рівнодення) та середня весною. Куш напівпрямий, листки помірно зеленого забарвлення, центральний листочок довгий, час цвітіння середній. Низька частота рослин з дуже темними синьо-фіолетовими квітками, дуже низька – зі змішаними, кремовими, білими та жовтими квітками. Рослина за довжиною та висотою середня з дуже низькою стійкістю до вертицильозного в'янення.

Середня урожайність сухої речовини становить: Лісостеп - 138,8ц/га, Полісся - 150,7ц/га. Гарантована прибавка: Лісостеп - 27,7ц/га, 19,9%, Полісся - 21,4ц/га, 14,2%. Вміст сирого протеїну: Лісостеп - 16,7%, Полісся - 20,7%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність: Лісостеп - 42,0%, Полісся - 40,3%. Днів до досягання: Лісостеп - 88,0 днів, Полісся - 57,0 днів. Напряму використання сінокісно-пасовищний.

## Степ

### ® 07058001 Банат ВС

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сади

Висота рослини від середньої до високої. Габітус проміжний. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, середнього розміру. Квітка середньою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками відсутня або дуже низька. Час початку цвітіння від раннього до середнього. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить - 79,0ц/га, Гарантована прибавка: 3,2ц/га, 4,05%. Вміст сирого протеїну - 17,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 59,0%. Днів до досягання - 80,0 дн. Напряму використання сінокісно-пасовищний.

## Лісостеп

### ® 05058002 Зоряна

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Висота рослини середня. Габітус прямий. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, листок за довжиною від середнього до довгого. Квітка з низькою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками відсутня або дуже низька. Час початку цвітіння середній. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить - 150,5ц/га, Гарантована прибавка: 39,4ц/га, 26,1%. Вміст сирого протеїну - 22,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність - 43,0%. Днів до досягання - 88,0 дн. Напряму використання сінокісно-пасовищний.

## Степ, Полісся

### ® 06058001 Синюха

Заявник: Інститут юрмів Української академії аграрних наук

Висота рослини від середньої до високої. Габітус напівпрямий. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, середнього розміру. Квітка середньою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками низька. Час початку цвітіння від раннього до середнього. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить: Степ - 80,0ц/га, Полісся - 163,3ц/га. Гарантована прибавка: Степ - 4,2ц/га, 5,25%, Полісся - 34,0ц/га, 20,8%. Вміст сирого протеїну: Степ - 18,0%, Полісся - 18,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Сорт характеризується високою стійкістю до хвороб. Залистяність: Степ - 61,0%, Полісся - 40,0%. Днів до досягання: Степ - 80,0 днів, Полісся - 56,5 днів. Напряму використання сінокісно-пасовищний.

## ЩИРЦЯ

### 08099002 Пальміра