

Рослина від низької до середньої (через два тижні після осіннього рівнодення) та середня весною. Куш напівпрямий, листки помірно зеленого забарвлення, центральний листочок довгий., час цвітіння середній. Низька частота рослин з дуже темними синьо-фіолетовими квітками, дуже низька – зі змішаними, кремовими, білими та жовтими квітками. Рослина за довжиною та висотою середня з дуже низькою стійкістю до вертицильозного в'янення.

Середня урожайність сухої речовини становить: Лісостеп - 138,8ц/га, Полісся - 150,7ц/га. Гарантована прибавка: Лісостеп - 27,7ц/га, 19,9%, Полісся - 21,4ц/га, 14,2%. Вміст сирого протеїну: Лісостеп - 16,7%, Полісся - 20,7%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Sort характеризується високою стійкістю до хвороб. Запистяність: Лісостеп - 42,0%, Полісся - 40,3%. Днів до досягання: Лісостеп - 88,0днів, Полісся - 57,0днів. Напряма використання сінокісно-пасовищний.

Степ

® 07058001 Банат ВС

Заявник: Інститут польовництва та овоцівництва, м. Нові Сад

Висота рослини від середньої до високої. Габітус проміжний. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, середнього розміру. Квітка середньою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками відсутня або дуже низька. Час початку цвітіння від раннього до середнього. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить - 79,0ц/га, Гарантована прибавка: 3,2ц/га, 4,05%. Вміст сирого протеїну - 17,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Sort характеризується високою стійкістю до хвороб. Запистяність - 59,0%. Днів до досягання - 80,0дн. Напряма використання сінокісно-пасовищний.

Лісостеп

® 05058002 Зоряна

Заявник: Інститут землеробства південного регіону Української академії аграрних наук

Висота рослини середня. Габітус прямий. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, листок за довжиною від середнього до довгого. Квітка з низькою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками відсутня або дуже низька. Час початку цвітіння середній. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить - 150,5ц/га, Гарантована прибавка: 39,4ц/га, 26,1%. Вміст сирого протеїну - 22,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Sort характеризується високою стійкістю до хвороб. Запистяність - 43,0%. Днів до досягання - 88,0дн. Напряма використання сінокісно-пасовищний.

Степ, Полісся

® 06058001 Синюха

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Висота рослини від середньої до високої. Габітус напівпрямий. Рослина з помірним зеленим забарвленням листків, середнього розміру. Квітка середньою частотою рослин з дуже темно-синіми і фіолетовими квітками, а також зі змішаними квітками низька. Час початку цвітіння від раннього до середнього. Після 3-го скошування рослина характеризується від низької до середнього.

Середня урожайність сухої речовини становить: Степ - 80,0ц/га, Полісся - 163,3ц/га. Гарантована прибавка: Степ - 4,2ц/га, 5,25%, Полісся - 34,0ц/га, 20,8%. Вміст сирого протеїну: Степ - 18,0%, Полісся - 18,0%. Має непогану зимостійкість та посухостійкість. Sort характеризується високою стійкістю до хвороб. Запистяність: Степ - 61,0%, Полісся - 40,0%. Днів до досягання: Степ - 80,0 днів, Полісся - 56,5днів. Напряма використання сінокісно-пасовищний.

Щириця

08099002 Пальміра

Антоціанове забарвлення сім'ядолі відсутнє, забарвлення листкова пластинка - зелена, габітус рослини прямостоячий, листок за формою - яйцеподібний, інтенсивність антоціанове забарвлення листка відсутня. Основний колір листка - світло-зелений, час початку цвітіння рослини - пізній, форма у поперечному розрізі стебла - хвилястий, суцвіття з кольором - коричнече, колір коріння під час цвітіння - білий. Насіння за формою - уліптичне.

® 08111006 Айра

Заявник:

Інститут юрмів Української академії аграрних наук

Плоїдність. Піхва листка з помірним забарвленням, листкова пластинка відкрита, забарвлення листка (восени в рік висіву) - темно-зелене. Прапорцевий листок за довжиною (на другий рік, за викиданням волоті) - від середньої до довгої, стебло за довжиною найдовшого (суцвіття включно, наприкінці цвітіння) - довге, остюки - відсутні. Нижня квіткова луска, опушення (за повної стиглості) - відсутнє.

Костриця червона

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан їстівний

08022001 Біла лілія

Заявник:

Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Заявник: : Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. За габітусом рослина: прямостояча; за висотою рослина, (см): середня (40-59); антоціанові забарвлення стебла: відсутнє; опушення стебла: слабе; довжина міжвузлів гілки: середня; за розміром листок, (см): великий (більше за 15); край листка: хвилястий; ступінь хвилястості краю листка: сильна; листок за кольором: зелений; пурпурний колір квітки: світлий; основна форма плоду: циліндрична; колір шкірки плоду у товарній стиглості: білий; ребристість плоду: відсутня; колір м'якуша плоду: білуватий, час фізіологічної стиглості: середній.

Урожайність, т/га: 35; Період від сівби до початку достигання, днів 110, Період плодоношення, днів 75, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9,6.

Лісостеп, Закритий ґрунт

09022002 Найт Леді F1

Заявник:

Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Плід рослини овальної форми, довгий, діаметр малий, колір шкірки у товарній стиглості темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні, колір шкірки за фізіологічної стиглості коричневий. Час фізіологічної стиглості середній.

Загальна урожайність - 6,5 кг/м²; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 95 днів; період плодоношення 60 днів; вміст сухої речовини в плоді 9 %.

Закритий ґрунт

® 08022003 Український Барон F1

Закритий ґрунт