

Антоціанове забарвлення сім'ядолі відсутнє, забарвлення листкова пластинка - зелена, габітус рослини прямостоячий, листок за формою - яйцеподібний, інтенсивність антоціанове забарвлення листка відсутня. Основний колір листка - світло-зелений, час початку цвітіння рослини - пізній, форма у поперечному розрізі стебла - хвилястий, суцвіття з кольором - коричнече, колір коріння під час цвітіння - білий. Насіння за формою - уліптичне.

® 08111006 Айра

Заявник:

Інститут юрмів Української академії аграрних наук

Плоїдність. Піхва листка з помірним забарвленням, листкова пластинка відкрита, забарвлення листка (восени в рік висіву) - темно-зелене. Прапорцевий листок за довжиною (на другий рік, за викиданням волоті) - від середньої до довгої, стебло за довжиною найдовшого (суцвіття включно, наприкінці цвітіння) - довге, остюки - відсутні. Нижня квіткова луска, опушення (за повної стиглості) - відсутнє.

Костриця червона

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан їстівний

08022001 Біла лілія

Заявник:

Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Заявник: : Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. За габітусом рослина: прямостояча; за висотою рослина, (см): середня (40-59); антоціанові забарвлення стебла: відсутнє; опушення стебла: слабе; довжина міжвузлів гілки: середня; за розміром листок, (см): великий (більше за 15); край листка: хвилястий; ступінь хвилястості краю листка: сильна; листок за кольором: зелений; пурпурний колір квітки: світлий; основна форма плоду: циліндрична; колір шкірки плоду у товарній стиглості: білий; ребристість плоду: відсутня; колір м'якуша плоду: білуватий, час фізіологічної стиглості: середній.

Урожайність, т/га: 35; Період від сівби до початку достигання, днів 110, Період плодоношення, днів 75, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9,6.

Лісостеп, Закритий ґрунт

09022002 Найт Леді F1

Заявник:

Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Плід рослини овальної форми, довгий, діаметр малий, колір шкірки у товарній стиглості темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні, колір шкірки за фізіологічної стиглості коричневий. Час фізіологічної стиглості середній.

Загальна урожайність - 6,5 кг/м²; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 95 днів; період плодоношення 60 днів; вміст сухої речовини в плоді 9 %.

Закритий ґрунт

® 08022003 Український Барон F1

Закритий ґрунт