

Антоціанове забарвлення сім'ядолі відсутнє, забарвлення листкова пластинка - зелена, габітус рослини прямостоячий, листок за формою - яйцеподібний, інтенсивність антоціанове забарвлення листка відсутня. Основний колір листка - світло-зелений, час початку цвітіння рослини - пізній, форма у поперечному розрізі стебла - хвилястий, суцвіття з кольором - коричнече, колір коріння під час цвітіння - білий. Насіння за формою - уліптичне.

® 08111006 Айра

Заявник:

Інститут юрмів Української академії аграрних наук

Плоїдність. Піхва листка з помірним забарвленням, листкова пластинка відкрита, забарвлення листка (восени в рік висіву) - темно-зелене. Прапорцевий листок за довжиною (на другий рік, за викиданням волоті) - від середньої до довгої, стебло за довжиною найдовшого (суцвіття включно, наприкінці цвітіння) - довге, остюки - відсутні. Нижня квіткова луска, опушення (за повної стиглості) - відсутнє.

Костриця червона

Сільськогосподарські: овочеві

Баклажан їстівний

08022001 Біла лілія

Заявник:

Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук

Заявник: : Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук. За габітусом рослина: прямостояча; за висотою рослина, (см): середня (40-59); антоціанові забарвлення стебла: відсутнє; опушення стебла: слабе; довжина міжвузлів гілки: середня; за розміром листок, (см): великий (більше за 15); край листка: хвилястий; ступінь хвилястості краю листка: сильна; листок за кольором: зелений; пурпурний колір квітки: світлий; основна форма плоду: циліндрична; колір шкірки плоду у товарній стиглості: білий; ребристість плоду: відсутня; колір м'якуша плоду: білуватий, час фізіологічної стиглості: середній.

Урожайність, т/га: 35; Період від сівби до початку достигання, днів 110, Період плодоношення, днів 75, Вміст : сухої речовини в плоді, % 9,6.

Лісостеп, Закритий ґрунт

09022002 Найт Леді F1

Заявник:

Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Плід рослини овальної форми, довгий, діаметр малий, колір шкірки у товарній стиглості темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні, колір шкірки за фізіологічної стиглості коричневий. Час фізіологічної стиглості середній.

Загальна урожайність - 6,5 кг/м²; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 95 днів; період плодоношення 60 днів; вміст сухої речовини в плоді 9 %.

Закритий ґрунт

® 08022003 Український Барон F1

Закритий ґрунт

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Рослина висока, габітус - напівпрямостоячий. Плід середній за довжиною та діаметром, форма циліндрична, колір шкірки у товарній стиглості - темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні. Колір м'якуша плоду білуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду коричневий. Час початку цвітіння і стиглості ранні.

Загальна врожайність - 25,8 т/га; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 121 день; період плодоношення 161 день; вміст сухої речовини в плоді 8,5 %.

09022005 Шарапова F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина висока, габітус - напівпрямостоячий. Плід середній за довжиною, діаметр середній, форма грушоподібна, колір шкірки у товарній стиглості - темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні. Колір м'якуша плоду зеленуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду коричневий. Час початку цвітіння і стиглості середній.

Загальна врожайність - 22,3 т/га, період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 85 днів; період плодоношення 15 днів; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2, макроспориозом 2; гнилями 2; вірусними хворобами 3; попелицею 3; вміст сухої речовини в плоді 9,8 %.

Буряк столовий

09023002 Акела

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина напівпроста, тип суцільддя - багаторостковий. Антоціанове забарвлення гіпокотеля наявне. Листок за довжиною середній - 51-65 см. Листкова пластинка еліптичної форми середнього розміру, світло-зеленого кольору, з слабким антоціаном. Хвилястість краю слабка, пухирчастість слабка. Листковий черешок вузький, червоного кольору. Коренеплід червоного кольору, округлий, заглиблений у ґрунт на 1/4. Довжина і ширина коренеплоду середня, форма основи плеската, окорковіння слабе. М'якуш темно-червоного забарвлення, прояв кілець відсутній або дуже слабкий. Схильність до стрілкування за раннього висіву сильна.

Загальна врожайність - 4,4 кг/м², маса товарного плоду - 470 г. Період від повних сходів до початку достигання - 125 днів. Вміст загального цукру - 7 %, сухої речовини в плоді - 8 %. Ураженість борошнистою росою - 2,3 %, церкоспорозом - 2%.

08023006 Лоретт

Заявник: Клоз

Сорт з одноростковим типом суцільддя. Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотіля. Положення черешка у просторі напівпряме. Листок за довжиною і шириною середній, еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової пластинки помірне, хвилястість краю слабка, пухирчастість помірна. Коренеплід еліптичної форми у поздовжньому розрізі, на 1/4 заглиблений в ґрунт, має помірне окорковіння. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якуша пурпурове. Прояв кілець помірний. Схильність до стрілкування за раннього висіву слабка.

Загальна врожайність сорту 55,0 т/га. Маса товарного плоду - 450 г. Вміст загального цукру - 9 %. Вміст сухої речовини у плоді - 11 %. Період від повних сходів до початку достигання 95 днів. Ураженість борошнистою росою - 1 %, ураженість церкоспорозом - 1 %.

08023010 Округлий темночервоний

Заявник: Ходовля Рослин Сновідза Сп. З.о.о