

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуца - Водиця"

Рослина висока, габітус - напівпрямостоячий. Плід середній за довжиною та діаметром, форма циліндрична, колір шкірки у товарній стиглості - темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні. Колір м'якуша плоду білуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду коричневий. Час початку цвітіння і стиглості ранні.

Загальна врожайність - 25,8 т/га; період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 121 день; період плодоношення 161 день; вміст сухої речовини в плоді 8,5 %.

## 09022005 Шарапова F1

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина висока, габітус - напівпрямостоячий. Плід середній за довжиною, діаметр середній, форма грушоподібна, колір шкірки у товарній стиглості - темно-фіолетовий, смугастість та ребристість відсутні. Колір м'якуша плоду зеленуватий. Колір шкірки за фізіологічної стиглості плоду коричневий. Час початку цвітіння і стиглості середній.

Загальна врожайність - 22,3 т/га, період від сівби до початку достигання (від висадки 30-ти денної розсади) 85 днів; період плодоношення 15 днів; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 2, макроспоріозом 2; гнилями 2; вірусними хворобами 3; попелицею 3; вміст сухої речовини в плоді 9,8 %.

## Буряк столовий

### 09023002 Акела

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Рослина напівпроста, тип суцільддя - багаторостковий. Антоціанове забарвлення гіпокотеля наявне. Листок за довжиною середній - 51-65 см. Листкова пластинка еліптичної форми середнього розміру, світло-зеленого кольору, з слабким антоціаном. Хвилястість краю слабка, пухирчастість слабка. Листковий черешок вузький, червоного кольору. Коренеплід червоного кольору, округлий, заглиблений у ґрунт на 1/4. Довжина і ширина коренеплоду середня, форма основи плеската, окорковіння слабе. М'якуш темно-червоного забарвлення, прояв кілець відсутній або дуже слабкий. Схильність до стрілкування за раннього висіву сильна.

Загальна врожайність - 4,4 кг/м<sup>2</sup>, маса товарного плоду - 470 г. Період від повних сходів до початку достигання - 125 днів. Вміст загального цукру - 7 %, сухої речовини в плоді - 8 %. Ураженість борошнистою росою - 2,3 %, церкоспорозом - 2%.

### 08023006 Лоретт

Заявник: Клоз

Сорт з одноростковим типом суцільддя. Паросток з антоціановим забарвленням гіпокотіля. Положення черешка у просторі напівпряме. Листок за довжиною і шириною середній, еліптичної форми. Антоціанове забарвлення листкової пластинки помірне, хвилястість краю слабка, пухирчастість помірна. Коренеплід еліптичної форми у поздовжньому розрізі, на 1/4 заглиблений в ґрунт, має помірне окорковіння. Колір шкірки червоний, основне забарвлення м'якуша пурпурове. Прояв кілець помірний. Схильність до стрілкування за раннього висіву слабка.

Загальна врожайність сорту 55,0 т/га. Маса товарного плоду - 450 г. Вміст загального цукру - 9 %. Вміст сухої речовини у плоді - 11 %. Період від повних сходів до початку достигання 95 днів. Ураженість борошнистою росою - 1 %, ураженість церкоспорозом - 1 %.

### 08023010 Округлий темночервоний

Заявник: Ходовля Рослин Сновідза Сп. З.о.о