

**Вид:** Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch**Заявка № 12079001 Назва сорту:** Іюньський ранній**Заявник (код):** 1850**Власник сорту (код):** 1850**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.03.2018**Патент № 180406****Дата пріоритету:** 12.12.2012**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: розмір	середній	5
2	Дерево: за силою росту	середнє	5
3	Дерево: габітус	від напівпрямого до розлого	2
4	Квітконосний пагін: за товщиною	товстий	7
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	короткий	3
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	помірне	5
9	Квітка: тип	розетковий	2
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	бліле	1
11	Пелюстка: форма	помірно еліптична	4
12	Лиш сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за ширину	ознака не визначається	0
13	Лиш сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за ширину	ознака не визначається	0
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	нижче	1
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2
17	Пиляки: пилок	наявний	9
18	Завязь: опушення	наявне	9
19	Прилистки: за довжиною	короткі	3
20	Листкова пластина: за довжиною	коротка	3
21	Листкова пластина: за ширину	вузька	3
22	Листкова пластина: відношення довжина / ширина	середнє	5
23	Листкова пластина: форма поперечного перерізу	увігнута	1
24	Листкова пластина: форма краю	ознака не визначена	0
25	Листкова пластина: кут основи	тупий	3
26	Листкова пластина: кут верхівки	малий	3
27	Листкова пластина: забарвлення	зелене	3
28	Листкова пластина: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	ознака не визначена	0
29	Черешок: за довжиною	короткий	3
30	Черешок: нектарники	наявні	9
31	Черешок: форма нектарників	ниркоподібна	2
32	Плід: розмір	середній	5
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3
34	Плід: загострення маточкового кінця	відсутнє	1
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	дуже вдавлена	5
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	помірно асиметричний	2
37	Плід: помітність шва	сильна	7
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5
39	Плід: ямка плодоніжки за ширину	середня	5
40	Плід: основне забарвлення шкірки	зеленувато-бліле	4
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	велика	7
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	червоний	5
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	плямистий	2
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9
45	Плід: щільність опушення шкірки	нешільне	3
46	Лиш для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянсуватість	ознака не визначається	0
47	Лиш для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0
48	Плід: шкірка за товщиною	тонка	3
49	Плід: зростання шкірки із м'якотю	помірне	5
50	Плід: твердість м'якоті	м'яка	3
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	кремово-бліле	3
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	відсутнє або дуже слабке	1
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	відсутнє або слабке	1
55	Плід: волокнистість м'якоті	помірна	2
56	Плід: цукристість	середня	5
57	Плід: кислотність	низька	2
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	оберненояйцеподібна	4
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	ознака не визначена	0
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3
62	Кісточка: рельєфність поверхні	лише борізди	5
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	помірна	5
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	наявне	9
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	помірний	5
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	ознака не визначена	0
67	Час початку цвітіння	середній	5
68	Час споживчої стигlosti	дуже ранній	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Середня урожайність – 6,6 т/га, середній урожай з дерева – 13,1 кг, середня маса плоду – 102 г, максимальна – 149 г. Вміст у плодах вітаміну С – 6,53 мг%, загального цукру – 11,06%, сухої речовини – 13,35%, загальна кислотність – 0,61%. Стійкість до клястероспоріозу – 7,5 балів. Вимерзання квіткових бруньок – 4 бала. Посухостійкість – 9 балів. Зимостійкість – 7 балів. Група стигlostі – дуже рання, напрям використання – столовий. Дегустаційна оцінка – 8,4 бала, транспортабельність – 6 балів.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**