

Тип суцільдда - багаторостковий. Антоціанове забарвлення гіпокотеля - наявне. Положення черешка листка - пряме. Листок довгий. Листкова пластинка довга, широка, еліптичної форми, світло-зелена, з слабким антоціаном, хвилястість краю - слабка, пухирчастість - слабка. Коренеплід яйцевидний, заглибленість у ґрунт середня - 1/4. Довжина і ширина коренеплоду середня, форма основи загострена. Окорковіння помірне. Колір шкірки - червоний. Основне забарвлення м'якуша - помірно пурпурове, темно пурпурове. Прояв кілець помірний. Схильність до стрілкування за раннього висіву - сильна.

Загальна врожайність 60 т/га, маса товарного плоду - 150-250 г. Вміст загального цукру - 11,5 %, сухої речовини в плоді - 16,5 %. Період від повних сходів до початку достигання - 115. Ураженість борошистою росю та церкоспорозом - слабка.

08023008 Ронда F1

Заявник: Бейо Заден Б.В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Бейо Заден Б. В. Тип суцільдда: багаторостковий; антоціанові забарвлення гіпокотеля паростка: наявне; положення черешка та листової пластинки: пряме; листок за довжиною (разом з черешком), (см): від середнього до довгого; листова пластинка за довжиною (см): довга (більша за 41), листова пластинка за шириною, (см): середня (16-20); форма листової пластинки: еліптична; інтенсивність зеленого забарвлення листової пластинки: помірне; антоціанове забарвлення листової пластинки: помірне; хвилястість краю листової пластинки: помірна; пухирчастість листової пластинки: слабка; форма поздовжнього розрізу коренеплоду: округла; коренеплід за довжиною, (см): середній (11-15); коренеплід за шириною, (см): середній (16-25); форма основи коренеплоду: округла; колір шкірки коренеплоду: червоний; основне забарвлення м'якуша коренеплоду: червоне.

Загальна урожайність сорту 75 т/га, маса товарного плоду - 230 г. Період від повних сходів до початку достигання 122 діб. Ураженість хворобами, % : церкоспорозом 2, Вміст : загального цукру, % 5,2.

Горox овочевий

08024021 Асана

Заявник: Нюнемс Б.В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома-трьома квітками на вузлі, мають ранній час цвітіння і середній достигання .

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок помірно зеленого кольору з наявним сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру, і довжини, і ширини, з наявною зубчастістю слабого ступеня її прояву та довгою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кроплячих вух" та відсутнім восковим нальотом, середній і за довжиною, і шириною з великою щільністю плямистості.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю його хвилястості.

Біб середньої і довжини, і ширини має зелений колір помірної інтенсивності, середню кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву. Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.