

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою його хвилястістю.

Біб має середню кількість насінних зачатків, короткий і ширини, сильної інтенсивності зеленій колір, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину з сильним ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – слабка.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 75 діб, період плодоношення – 5 діб та дружністю достигання 90 %.

Урожайність загальної продукції становить 4, 2 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 240 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 8 балів.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20,5 %, загального цукру – 6,3 %, білка – 21,2 %.

Ураженість аскохітозом досягає 10 %, кореневими гнилями – 10 %.

## ® 08024020 Бутана

Заявник:

Нюнемс Б.В.

## Степ, Лісостеп, Полісся

Рослини сорту високі, без антоціанового забарвлення та наявними вторинними листочками, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, довге та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок помірно зеленого кольору з наявним сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: малою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, дуже маленьким їх розміром, короткі за довжиною та вузькі за шириною, з відсутньою зубчастістю та короткою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, довгий і широкий із помірно щільністю плямистості.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квіткі, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою інтенсивністю його хвилястості.

Біб середньої і довжини, і ширини має зеленій колір помірно інтенсивності, середню кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву. Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 60 діб, період плодоношення – 7 діб та дружністю достигання 99 %.

Урожайність товарної продукції становить 12, 2 т/га, а загальної – 12,0 т/га бобів. Маса 100 бобів – 240 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,5 балів.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20 %, загального цукру – 7,1 %.

Ураженість аскохітозом досягає 3 %, кореневими гнилями – 21 %.

## 08024015 Драгон

## Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: СЕМО а.с.

Рослини сорту з висотою від низької до середньої без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають від дуже раннього до раннього і час цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, має довжину від короткої до середньої та малу кількість вузлів (з першим фертильним вузлом включно).

Листок помірно зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: від малої до середньої їх кількості, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру довжини та шириною – від середньої до широкої, відсутньою зубчастості та середньою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, довжиною від короткої до середньої, середньою шириною та інтенсивністю кількості плямистості від дуже малої до малої.

Квітка з параметрами довжини квітконіжки від середньої до першої квіткі – від середньої до великої, шириною чашолистика – від малої до середньої та загостреною формою верхівки вершнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з максимальною його шириною – від малої до середньої, формою основи – від вигнутої до дуже вигнутої та інтенсивністю його хвилястості – від дуже слабкої до середньої.

Біб має довжину від дуже короткої до короткої та вузлуку ширину, зелений колір помірної інтенсивності, середню кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину з слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму кінця, з незначальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору зі зморшкуватістю від помірної до сильної. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – від дуже малої до малої.

08024016 Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 70 діб, період плодоношення – 4 доби та дружність достигання – 91 %.

Урожайність товарної продукції становить 11,0 т/га, загальної – 6 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 125 г.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 21 %, загального цукру – 13 %, білка – 6 %, бобів з пергаментом – 100 %.

Ураженість і аскохітозом, і кореневими гнилями досягає 2 %.

## 08024019 Донана

## Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Ньюемс Б.В.

Рослини сорту низькі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають ранній час цвітіння і середній достигання.

Стебло нефасційоване, коротке та має багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору зі слабкою інтенсивністю забарвлення, відсутнім сіруватим відтінком, добре розвинутий з наявною формою "кролячих вух", наявним восковим нальотом, короткої та середньої ширини з великою щільністю плямистості.

Черешок за довжиною від пазухи до першого вулика – середній.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квіткі, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітуючому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та слабкою його хвилястістю.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середньої довжини, і ширини, помірної інтенсивності зеленого колір, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – слабка.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною слабкою