

зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – велика.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 49 діб, період плодоношення – 7 діб та дружність достигання 99 %.

Урожайність товарної продукції становить 11, 9 т/га, а загальної – 11, 7 т/га бобів. Маса 100 бобів – 230 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,5 бала.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 21 %, загального цукру – 7, 2 %.

Ураженість аскохітозом досягає 2, 9 %, кореневими гнилями – 18 %.

08024018 Заміра

Заявник:

Нюнемс Б.В.

Степ, Лісостеп, Полісся

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення з наявними вторинними листочками, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Вторинні листочки дуже маленькі за розміром, короткі та вузькі, кількість їх мала, середньої довжини і вузькі, мають коротку відстань від найширшої частини до основи та відсутню зубчастість. На верхніх вторинних листочках наявний восковий наліт.

Прилисток зеленого кольору з помірною інтенсивністю забарвлення, наявним сіруватим відтінком, добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і наявним восковим нальотом, середніми показниками довжини і ширини без плямистості.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квіткі, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою його хвилястістю.

Біб має середню кількість насінних зачатків, середньої і довжини, і ширини, сильної інтенсивності зеленій колір, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з середнім ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 50 діб, період плодоношення – 6 діб та дружність достигання 98 %.

Урожайність товарної продукції становить 11, 6 т/га, а загальної – 12, 1 т/га бобів. Маса 100 бобів – 220 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4, 5 бала.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20 %, загального цукру – 6, 9 %.

Ураженість аскохітозом досягає 3 %, кореневими гнилями – 19 %.

06024003 Ланковий

Заявник:

Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Лісостеп, Полісся

Рослини сорту високі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають пізній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, довге та має багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору помірною інтенсивністю з сіруватим відтінком, добре розвинутий з наявними формою "кролячих вух" і воскового нальоту, довгий і широкий з великою щільністю плямистості.