

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса від білого до кремового з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та помірною інтенсивністю його хвилястості.

Біб має велику кількість насінних зачатків, дуже довгий, середньої ширини, помірно інтенсивності зелений колір, наявне пергаментність, увігнутий тип вигину зі слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 85 діб, період досягання – 10 діб та дружність досягання 94 %.

Урожайність товарної продукції становить 20, 5 т/га, а загальної – 22,3 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 442,5 г.

Дегустаційна оцінка свіжих бобів – 4,6 бала.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20,1 %, загального цукру – 6,3 %.

Ураженість аскохітозом і кореневими гнилями – відсутні.

Рекомендовані зони вирощування: Лісостеп, Полісся.

## 08024010 Оксамит

## Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Луганський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Рослини середньої висоти, без антоціанового забарвлення, наявними вторинними листочками, з двома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і досягання.

Стебло нефасційоване, коротке та має середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листки зеленого кольору з сильної інтенсивністю забарвлення, наявним сіруватим відтінком, відсутнім восковим нальотом на верхніх вторинних листочках та середньою їх кількістю.

Вторинні листочки маленькі за розміром, мають середню довжину, вузькі, середню відстань від найширшої частини до основи та відсутню зубчастість.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і наявним восковим нальотом, має середню і довжину, і ширину з малою плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, прямою формою основи та слабкою його хвилястістю.

Біб має велику кількість насінних зачатків, середню і довжину, і ширину, помірно інтенсивності зелений колір, наявну пергаментність, випуклий тип вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 55 діб, період плодоношення – 5 діб та дружністю досягання

Урожайність ранньої продукції становить 8,95 т/га, а загальної – 9,57 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 175 г. Боби з наявною пергаментністю (100 %). Дегустайна оцінка свіжих бобів – 8,7 бала. Вміст сухої речовини в зерні досягає 21,7 %, загального цукру – 10,4 %. Ураженість аскохітозом – 0,8 %, кореневими гнилями – 2,1 %.

### 05024005 Ранок

### Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту за висотою - низькі, без антоціанового забарвлення і вторинними листочками, з одною-двома квітками на вузлі, мають дуже ранній час і цвітіння, і ранній дозрівання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має малу кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору помірної інтенсивності без сіруватого відтінку, добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і відсутнім восковим нальотом, має середню і довжину, і ширину з малою плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та відсутньою або дуже слабкою його хвилястістю.

Біб має малу кількість насінних зачатків, середню і довжину, і ширину, слабкої інтенсивності зеленій колір, з наявною пергаментністю, відсутній тип вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту з періодом від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 50 діб, періодом плодоношення – 21 добу та дружністю дозрівання 92 %.

Боби з наявною пергаментністю. Урожайність і ранньої, і загальної продукції становить 6,2 т/га бобів. Ураженість аскохітозом - 18 %, кореневими гнилями – 10.

### 06024002 Спадок

Заявник: Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту дуже високі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають пізній час і цвітіння, і дозрівання.

Стебло нефасційоване, дуже довге та має багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток жовто-зеленого кольору з сіруватим відтінком, добре розвинутий з наявною формою "кролячих вух" та відсутнім восковим нальотом, середньої довжини і широкий із помірно щільністю плямистості.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса від білого до кремового з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та слабкою інтенсивністю його хвилястості.

Біб довгий та дуже широкий, має жовтий колір, велику кількість насінних зачатків, частково наявну пергаментність з наявним