

Урожайність ранньої продукції становить 8,95 т/га, а загальної – 9,57 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 175 г. Боби з наявною пергаментністю (100 %). Дегустайна оцінка свіжих бобів – 8,7 бала. Вміст сухої речовини в зерні досягає 21,7 %, загального цукру – 10,4 %. Ураженість аскохітозом – 0,8 %, кореневими гнилями – 2,1 %.

05024005 Ранок

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Донецька дослідна станція Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту за висотою - низькі, без антоціанового забарвлення і вторинними листочками, з одною-двома квітками на вузлі, мають дуже ранній час і цвітіння, і ранній дозрівання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має малу кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток зеленого кольору помірної інтенсивності без сіруватого відтінку, добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" і відсутнім восковим нальотом, має середню і довжину, і ширину з малою плямистістю.

Квітка з середньою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, піднесеною формою основи та відсутньою або дуже слабкою його хвилястістю.

Біб має малу кількість насінних зачатків, середню і довжину, і ширину, слабкої інтенсивності зеленій колір, з наявною пергаментністю, відсутній тип вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту з періодом від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 50 діб, періодом плодоношення – 21 добу та дружністю дозрівання 92 %.

Боби з наявною пергаментністю. Урожайність і ранньої, і загальної продукції становить 6,2 т/га бобів. Ураженість аскохітозом - 18 %, кореневими гнилями – 10.

06024002 Спадок

Заявник: Дослідна станція "Маяк" Інституту овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту дуже високі, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома квітками на вузлі, мають пізній час і цвітіння, і дозрівання.

Стебло нефасційоване, дуже довге та має багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Прилисток жовто-зеленого кольору з сіруватим відтінком, добре розвинутий з наявною формою "кролячих вух" та відсутнім восковим нальотом, середньої довжини і широкий із помірно щільністю плямистості.

Квітка з великою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та загострену форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса від білого до кремового з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та слабкою інтенсивністю його хвилястості.

Біб довгий та дуже широкий, має жовтий колір, велику кількість насінних зачатків, частково наявну пергаментність з наявним