

потовщенням ступок, увігнутий тип вигину зі слабким ступенем його прояву. Волокна (жилки) шва відсутні або рудиментальні.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина неправильної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною сильною зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

08024012 Талбот F1

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник:

Монсанто Холланд Б.В.

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають середній час цвітіння і ранній достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок помірно зеленого кольору з наявним сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру, і довжини, з відсутньою зубчастістю та середньою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, середній і за довжиною та вузький з помірно щільністю плямистості.

Квітка з малою довжиною квітконіжки від стебла до першої квітки, має середню ширину чашолистика та округлу форму верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з середньою максимальною його шириною, вигнутою формою основи та помірно інтенсивністю його хвилястості.

Біб середньої і довжини і вузький, має зелений колір сильної інтенсивності, велику кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину з відсутнім або дуже слабким ступенем його прояву.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – сильна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – середня.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 52 діб, період плодоношення – 8 діб та дружність достигання 70 %.

Урожайність товарної продукції становить 12, 0 т/га, а загальної – 8 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 140 г.

Дегаустиційна оцінка свіжих бобів – 4 бали.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 20 %, загального цукру – 3,25 %, білка – 4,65 %.

08024022 Урбана

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник:

Нюнемс Б.В.

Рослини сорту середньої висоти, без антоціанового забарвлення і вторинних листочків, з двома-трьома квітками на вузлі, мають середній час і цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, середньої довжини та має дуже багато вузлів з першим фертильним вузлом включно.