

Ураженість аскохітозом досягає 3 %, кореневими гнилями – 16 %.

Степ, Лісостеп, Полісся

08024014 Цезарь

Заявник: СЕМО а.с.

Рослини сорту з висотою від низької до середньої, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають від дуже раннього до раннього і час цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, має довжину від короткої до середньої та кількість вузлів (з першим фертильним вузлом включно) від малої до середньої.

Листок помірно зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, від маленького до середнього розміром, від короткої до середньої довжиною та від вузької до середньої шириною, відсутньою зубчастості та середньою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, має коротку довжину, вузьку ширину та помірну інтенсивність щільності плямистості.

Квітка з параметрами довжини квітконіжки від стебла до першої квітки – від середньої до великої, малою шириною чашолистика та загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з максимальною його шириною від малої до середньої, формою основи від прямої до дуже вигнутої та

інтенсивністю його хвилястості від відсутньої до дуже слабкої.

Біб має середню довжину та вузьку ширину, зелений колір помірної інтенсивності, середню кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину зі ступенем його прояву від слабкого до середнього.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з помірною зморшуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 75 діб, період плодоношення – 4-5 діб та дружиністю достигання 90 %.

Урожайність товарної продукції становить 12, 0 т/га, а загальної – 6,5 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 125 г.

Вміст загального цукру – 13,8 %, білка – 6,2 %, бобів з пергаментом – 100 %.

Ураженість аскохітозом та корневими гнилями досягає по 2 %.

Степ, Лісостеп, Полісся

08024016 Цетрис

Заявник: СЕМО а.с.

Рослини сорту від низької до середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, трьома квітками на вузлі, мають від раннього до середнього час цвітіння і ранній достигання.

Стебло нефасційоване, має довжину від короткої до середньої та середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок помірно зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру, і довжини та шириною від вузької до середньої, з відсутньою зубчастістю та відстанню від найширшої частини до основи від середньої до довгої.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, середній за довжиною та шириною від вузької до середньої з помірно щільністю плямистості.