

Ураженість аскохітозом досягає 3 %, кореневими гнилями – 16 %.

08024014 Цезарь

Заявник: СЕМО а.с.

Рослини сорту з висотою від низької до середньої, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, двома квітками на вузлі, мають від дуже раннього до раннього і час цвітіння, і достигання.

Стебло нефасційоване, має довжину від короткої до середньої та кількість вузлів (з першим фертильним вузлом включно) від малої до середньої.

Листок помірно зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, від маленького до середнього розміром, від короткої до середньої довжиною та від вузької до середньої шириною, відсутньою зубчастості та середньою відстанню від найширшої частини до основи.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, має коротку довжину, вузьку ширину та помірну інтенсивність щільності плямистості.

Квітка з параметрами довжини квітконіжки від стебла до першої квітки – від середньої до великої, малою шириною чашолистика та загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з максимальною його шириною від малої до середньої, формою основи від прямої до дуже вигнутої та

інтенсивністю його хвилястості від відсутньої до дуже слабкої.

Біб має середню довжину та вузьку ширину, зелений колір помірної інтенсивності, середню кількість насінних зачатків, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину зі ступенем його прояву від слабкого до середнього.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з помірною зморшуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – мала.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 75 діб, період плодоношення – 4-5 діб та дружиністю достигання 90 %.

Урожайність товарної продукції становить 12,0 т/га, а загальної – 6,5 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 125 г.

Вміст загального цукру – 13,8 %, білка – 6,2 %, бобів з пергаментом – 100 %.

Ураженість аскохітозом та корневими гнилями досягає по 2 %.

08024016 Цетрис

Заявник: СЕМО а.с.

Рослини сорту від низької до середньої висоти, без антоціанового забарвлення, з наявними вторинними листочками, трьома квітками на вузлі, мають від раннього до середнього час цвітіння і ранній достигання.

Стебло нефасційоване, має довжину від короткої до середньої та середню кількість вузлів з першим фертильним вузлом включно.

Листок помірно зеленого кольору з відсутнім сіруватим відтінком.

Вторинні листочки характеризуються такими показниками: середньою їх кількістю, наявністю воскового нальоту на верхніх листочках, середніми параметрами і розміру, і довжини та шириною від вузької до середньої, з відсутньою зубчастістю та відстанню від найширшої частини до основи від середньої до довгої.

Прилисток добре розвинутий з відсутньою формою "кролячих вух" та наявним восковим нальотом, середній за довжиною та шириною від вузької до середньої з помірно щільністю плямистості.

Квітка з параметрами довжини квітконіжки від стебла до першої квіткі від малої до середньої, шириною чашолистика – від малої до середньої та загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з максимальною його шириною від малої до середньої, формою основи від прямої до вигнутої та інтенсивністю його хвилястості від дуже слабкої до слабкої.

Біб має довжину від дуже короткої до короткої, ширину – від дуже вузької до вузької, зелений колір помірної інтенсивності, кількість насінних зачатків від середньої до великої, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину з ступенем його прояву від слабкого до середнього.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – від дуже малої до малої.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 80 діб, період плодоношення – 4-5 діб та дружність досягання 92 %.

Урожайність товарної продукції становить 13,0 т/га, а загальної – 7 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 115 г.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 22 %, загального цукру – 13,2 %, білка – 6,3 %, бобів з пергаментом – 100 %.

Ураженість аскохітозом досягає 1 %, кореневими гнилями – 1 %.

Диня посівна (звичайна)

09025001 Амалік F1

Заявник:

Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Закритий ґрунт

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, слабка зубчастість, хвилястість країв помірна. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків вертикальна. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період досягання брудно-жовтий, форма основи і верхівки заокруглена, зморшкуватість поверхні помірна, коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі середній, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 5,5 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 15 днів; Вміст: сухої речовини у плоді - 17 %, загального цукру - 15,6 %.

® **08025004 Воллер**

Заявник:

Нюнемс Б.В.

Лісостеп, Полісся

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок короткий за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період досягання зеленій, форма основи і верхівки плеската, смуги відсутні, наявні зморшкуватість поверхні і коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.