

Квітка з параметрами довжини квітконіжки від стебла до першої квітки від малої до середньої, шириною чашолистика – від малої до середньої та загостреною формою верхівки верхнього чашолистика на другому квітучому вузлі.

Колір паруса білий з максимальною його шириною від малої до середньої, формою основи від прямої до вигнутої та інтенсивністю його хвилястості від дуже слабкої до слабкої.

Біб має довжину від дуже короткої до короткої, ширину – від дуже вузької до вузької, зелений колір помірної інтенсивності, кількість насінних зачатків від середньої до великої, наявну пергаментність, увігнутий тип вигину з ступенем його прояву від слабого до середнього.

Інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин – помірна.

Насінина циліндричної форми, має складну форму крохмальних зерен та сім'ядолі зеленого кольору з наявною помірно зморшкуватістю. Чорне забарвлення рубчика відсутнє.

Маса 1000 насінин – від дуже малої до малої.

Рослини сорту мають період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості 80 діб, період плодоношення – 4-5 діб та дружність досягання 92 %.

Урожайність товарної продукції становить 13,0 т/га, а загальної – 7 т/га бобів. Маса 1000 зерен – 115 г.

Вміст сухої речовини в зерні досягає 22 %, загального цукру – 13,2 %, білка – 6,3 %, бобів з пергаментом – 100 %.

Ураженість аскохітозом досягає 1 %, кореневими гнилями – 1 %.

Дня посівна (звичайна)

09025001 Амалік F1

Заявник: Юнайтед Генетікс Італія С.п.А.

Закритий ґрунт

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, слабка зубчастість, хвилястість країв помірна. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків вертикальна. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період досягання брунатно-жовтий, форма основи і верхівки заокруглена, зморшкуватість поверхні помірна, коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі середній, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 5,5 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 60 днів; період плодоношення 15 днів; Вміст: сухої речовини у плоді - 17 %, загального цукру - 15,6 %.

® 08025004 Воллер

Заявник: Ньюемс Б.В.

Лісостеп, Полісся

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок короткий за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю дводомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: короткий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період досягання зеленій, форма основи і верхівки плеската, смуги відсутні, наявні зморшкуватість поверхні і коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 40 т/га; період від повних сходів до першого збору 25 днів; період від першого до останнього збору 15 днів; ураженість борошністою росю - 30 %, вірусними хворобами - 60%; пошкодження шкідниками - попелицею - 30 %, вміст сухої речовини у плоді - 15 %, вміст загального цукру - 12 %.

Закритий ґрунт

® 08025003 Євпраксія

Заявник: Науково - дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща - Водиця"

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок короткий, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю одностомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зеленій. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу округла, основний колір шкірки в період досягання жовтій, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка. М'якуш в поперечному розрізі товстий, колір зеленій. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 14,9 т/га; період від повних сходів до першого збору 46 днів; Вміст: сухої речовини у плоді - 7,4 %, загального цукру - 10,1 %.

Закритий ґрунт

09025002 Каріббіан Голд

Заявник: Рійк Цваан Велвер ГмбХ

Листкова пластинка характеризується такими показниками: велика, слабка інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, слабка зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю одностомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням сіро-зелений. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу яйцевидна, основний колір шкірки в період досягання білій, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі середній, колір оранжевий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 45 т/га; період від повних сходів до першого збору 65 днів; період плодоношення 12 днів; ураженість антракнозом - 0,2 %. Вміст: сухої речовини у плоді - 11 %, загального цукру - 5,5 %.

08025008 Має F1

Заявник: Клоз

Листкова пластинка характеризується такими показниками: середній розмір, помірна інтенсивність зеленого забарвлення, помірна вираженість лопатей, помірна зубчастість і хвилястість країв. Черешок середній за довжиною, положення у фазі трьох листків напівпряме. Квітки за статтю одностомні. Основний колір шкірки плоду перед досяганням зеленій. Для плоду характерні такі ознаки: довгий, за діаметром середній, місце найбільшої ширини у центрі, форма поздовжнього розрізу еліптична, основний колір шкірки в період досягання зеленій, форма основи і верхівки заокруглена, смуги відсутні, зморшкуватість поверхні відсутня або дуже слабка, коркове утворення з сітчастим візерунком. М'якуш в поперечному розрізі середній за товщиною, колір кремовий. Насінина еліптична за формою у поперечному розрізі, кремово-жовтого кольору.

Загальний урожай 6 кг/м²; період від повних сходів до першого збору 95 днів; період плодоношення 60 днів; ураженість борошністою росю - 0,5 %, бактеріозом - 1,5 %, антракнозом - 0,5 %, вірусними хворобами - 2%. Вміст: сухої речовини у плоді - 10 %, загального цукру - 18 %.

09025004 Міра F1

Закритий ґрунт